


# Bella HEXAL 35<sup>®</sup>

## Zur hormonellen Aknetherapie.

**SCHWERPUNKT**

**INFEKTIONEN**



Starke Schmerzen sind das Leitsymptom, die Ursache ist unbekannt, die Behandlung gestaltet sich schwierig: Über den aktuellen Stand von Diagnostik und Therapie der Interstitiellen Cystitis informieren wir Sie im Schwerpunkt

**ab Seite 36**

**Interstitielle Cystitis**  
 Leitsymptom starke Schmerzen:  
 Diagnostik und Therapie einer rätselhaften Krankheit.....36  
 Rehabilitieren statt Blase operieren.....39


**Syphilis**  
 Treponema kehrt zurück.....40

**Humane Papillomaviren**  
 Onkogenen Viren auf der Spur .....42

**Aids**  
 Bessere Medikamente – höhere Risiken.....44  
 Migrantinnen: Therapie heilt nicht fehlende Perspektiven .....45  
 HIV-Infizierte im Kampf mit der Bürokratie .....46

**Patienteninfo**  
 Harnwegsinfekten wirkungsvoll vorbeugen.....47

**ÄP-Service**  
 Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Adressen .....48



Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Gynäkologie finden Sie auf unserer Homepage unter [www.aerztlichepraxis.de](http://www.aerztlichepraxis.de)

Fotos: Klinikum rechts der Isar, Abt. f. Plast. Chirurgie, KES, TK, mammaNetz; Titelbild: Archiv

- Bioäquivalent zu Diane<sup>®</sup>-35
- 3 Packungsgrößen
- Preisvorteil bis **28%\***

\*gegenüber Diane<sup>®</sup>-35

**Arzneimittel  
Ihres Vertrauens**



Bella HEXAL 35<sup>®</sup> 2 mg/0,035 mg, überz. Tabl.: Wirkst.: Cyproteronacetat, Ethinylestradiol. **Zusammensetzung:** Jede Tabl. enth. 2000 Mikrogramm Cyproteronacetat u. 35 Mikrogramm Ethinylestradiol. Tabl. kern: Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph. Eur.), Maisstärke, Povidon K25, Talkum Tabl.-umhüll., Ca Carbonat, Glycerol 85 %, Macrogol 6000, Montanpolyolwachs, Povidon K90, Sacrose, Talkum Farbst. E 171, E 172. **Anwendungsgeb.:** Bella HEXAL 35 ist nur indiz. zur Anwend. bei Frau zur Behandl. von schwerer Akne, die auf eine orale Langzeit-Thera mit Antibiotika nicht anspricht u. bei mäßig schwerer Hirsutismus. **Gegenanz.:** Überempf., Schwangersch., Stillz., schwerer Leberfunkt. stor., Gelbsucht, anhalt. Juckreiz währ. einer früh. Schwangersch., Dubin-Johnson-Syndrom, Rotor-Syndrom, besteh. Lebertumor, od. Lebertumor in der Anamnese, besteh. od. vorausgegang. arteriell. od. venöse thrombotische od. embolische Prozesse sowie dazu disponier. Zustände, wie z. B. Stör. des Gerinnungsprozesses, Herzklappenerkrank. u. Vorhofflimmern, Sichelzellanämie, Mamma- od. Endometriumkarzinom, Verdacht auf Mamma- od. Endometriumkarzinom bzw. diese Krankh. bild. in der Anamnese, schwer. Diab. mell. mit Gefäßveränd., Fettstoffwechselstor., Herpes gestationis in der Anamnese, Osteoporose mit Verschlecht. währ. der Schwangersch., ungleich. anormale Vaginaabblut., schwer. Hypotonie, Migräne mit Aura. **Nebenwirk.:** Depress. Verstimm., Kopfschmerz, verstärkt epilept. Anfälle, Seh- u. Hörstör. od. Wahrnehm. stor., erhöh. Risiko für eine venöse Thromboembolie, arteriell. Thrombose einschließl. Hirn- u. Myokardinfarkt, Subarachnoidalblut., Bluthochdruck, Magenbeschwerd., Übelk., Erbrechen, quater. od. bosart. Lebertumor, lebensgef. Blut. u. od. Bauchhöhle, Chloasma, Brustkrebs, Absond. aus der Brust u. od. Brustvergröß., Brustspannen, Libidoveränd., Redukt. des Menstrationsflusses, fehl. Menstruation, Zwischenblut., Veränd. des Körpergewicht., schlecht. Verträglichk. von Kontaktlinsen, Einfluss auf bestimmte Labortests einschließl. biochem. Parameter der Leber-, Schilddrüsen-, Nebennieren- und Nierenfunkt., Plasmaspiegel von Transportproteinen u. Lipid-, Lipoprotein-Fractionen, Parameter des Kohlenhydratmetabolismus, Parameter der Gerinnung u. Fibrinolyse, Anstieg der Sedimentationsrate des Blutes, von Kupfer u. Eisen im Serum sowie der alkalischen Phosphatase, Enth. Lactose u. Sacrose. Weist Einzelz. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Verschreibungspflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/301357. **Stand:** Juli 2004. HEXAL AG, 83307 Holzkirchen. <http://www.hexal.de>