

## Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde

Idiopathische zyklitische retrolentale Membranen ohne Assoziation mit einer chronischen Uveitis treten im Kindesalter selten auf. Die klinische Prognose hängt von der histologischen Zusammensetzung der Membran ab.

- 275 Bilaterale peripapilläre subretinale neovaskuläre Membranen in Assoziation mit chronischem Papillenödem: Beschreibung zweier Fälle  
C. Nguyen, F.-X. Borruat

- 275 Bilateral Peripapillary Subretinal Neovessel Membrane Associated with Chronic Papilledema: Report of Two Cases  
C. Nguyen, F.-X. Borruat

Die Senkung des intrakraniellen Drucks resultierte bei zwei Patienten mit chronischem Papillenödem in einer Rückbildung der peripapillären subretinalen neovaskulären Membranen (PSNVM). Somit sollte die Laseranwendung bei neovaskulären Membranen erst nach Behandlung der intrakraniellen Pathologie angewendet werden.

### Quiz

- 279 Fundus-Quiz 2004  
P. Bischoff, R. Rüesch, C. Valmaggia

### Quiz

- 279 Fundus Quiz 2004  
P. Bischoff, R. Rüesch, C. Valmaggia

- 284 Offene Korrespondenz