M. Bellgardt, Ch. Blase, M. Grümme, C. Sirtl, H. Vogelsang, H. Laubenthal, A. Meiser: Erste Erfahrungen mit dem Anästhetikareflektor AnaConDa™ auf einer operativen Intensivstation: über 2000 Stunden inhalative Sedierung mit Isofluran

e-

ast-

١t

der

na-

oie:

h

- 157 C. Bezler, U. Grouven, B. Schultz, A. Schultz: EEGgesteuerte Fast-Track-Narkosen in der Neurochirurgie
- 158 C. Bieker, N. Diekmann, S. Kügler, M. Grünewald: Etablierung einer regelmäßigen Schulung in kardiopulmonaler Reanimation für Mitarbeiter des Pflegedienstes in einem Universitätsklinikum
- 158 G. J. A. Bloo, W. Scholte op Reimer, B. J. P. Crul, T. van Achterberg: Music is effective in reducing acute pain and anxiety: A meta analysis
- 159 A. Brauer, C. von Heymann, C. Spies, I. Rundshagen: Indikationen und Outcome nach Gabe von Prothrombinkomplex: eine retrospektive Analyse in der operativen Medizin
- 159 H. Damla, S. Awan, N. C. Weber, O. Toma, B. Preckel, W. Schlack: Induziert Lachgas eine Präkonditionierung im Rattenherzen in vivo?
- K. Dudek, K. Niewińska, J. Sokolowski, J. Jakubaszko:
 Diagnosis and surgical treatment of tracheal rupture
 3 case reports
- 161 A. Dullenkopf, A. Schmitz, B. Salgo, M. Weiss: Air tonometrically measured rectal luminal PrCO2 does not reflect gastric luminal PrCO2 in children
- 161 L. H. J. Eberhart, I. Celik, M. Schäg, M. Simon, P. Kranke: Reliabilität und Validität eines Fragebogens für die Patientenbeurteilung der perioperativen Phase (PPP33-Fragebogen)
- M. Fogliata, T. Feyerherd, D. Pavlovic, M. Gruendling, M. Wendt, Ch. Lehmann: Ketamine and propofol do not affect intestinal microcirculation in the rat endotoxemia
- 162 A. Götte, T. Jock, A. S. Janitzki: Erfahrungen mit sympatho-vegetativen Messungen in der Schmerztherapie bei CRPS
- 163 M. Großherr, A. Hengstenberg, L. Dibbelt, R. Noel, T. Meier, P. Schmucker, H. Gehring: Der Nachweis von Propofol in der Atemluft ermöglicht Rückschlüsse auf die Plasmaspiegel
- 163 D. Hadzidiakos, St. Petersen, J. Baars, B. Rehberg: Weder BIS noch cAAI unterscheiden zwischen Bewusstseinszuständen mit und ohne Erinnerungsbildung während Propofol-Sedierung

- 164 M. Hansen, G. Wagner, G. Klein: Der Einsatz der Echokardiographie bei instabilem Kreislauf nach Sectio caesarea
- 164 T. Hardt, I. Dressler, T. Fritzsche, C. Spies, I. Rundshagen: Beeinflusst das EEG-Monitoring mittels Narcotrend die Narkoseführung?
- 165 L. Heuer, P. Marré, D. Blumenberg: Rekombinanter
 Faktor VIIa zur adjuvanten Hämostasekontrolle bei
 konservativ nicht beherrschbarer Blutung aus einer
 Mallory-Weiss-Läsion
- 165 J. Jakubaszko, I. Urbanowicz, P. Paciorek, J. Hałas: Patients with Acute Coronary Syndromes in everyday practice of Emergency Medicine Department in University Hospital
- 166 T. Junghans, M. Strohauer, H. Neuss, O. Haase, C. Langelotz, W. Schwenk: Maskierte Dehydratation durch die traditionelle präoperative Patientenvorbereitung bei Kolonresektionen
- 166 T. Junghans, F. Dörner, J. Neudecker, B. Möbius, M. Scharfenberg, W. Schwenk: Verbesserung der Splanchnicusdurchblutung durch kolloidale Infusionen bei laparoskopischen Operationen
- 167 S. C. Kettner, T. Seybold, C. Gonano: Cost comparison of spinal vs. general anaesthesia in orthopaedic surgery
- 167 R. Klose, M. Fischer: Pulmonale Melioidose ein Fallbericht
- J. B. Kobela, L. Eger, A. Knopf, W. Boemke, G. Grosse-Siestrup, J. K. Unger: HES130/0.4 und Albumin unterstützen die Hämokompatibilität und reduzieren den Heparinverbrauch bei CVVH im Schweinemodell
- A. Lau, I. Krüger, H. D. Volk, C. Spies: Präoperative Alkoholkrankheit und deren Einfluss auf die Gen-Expression der Transkriptionsfaktoren T-bet, GATA-3, Eomesodermin und FoxP3
- 169 G. Lehmann, F. Folchert, B. Schug, M. Anschütz: Charakterisierung der Magenentleerung einer proteinhydrolysathaltigen, kohlenhydratreichen Trinknahrung im Vergleich zu einer kohlenhydratreichen Referenznahrung
- J. Lemken, A. Petersen, W. Schlack, B. Preckel: Beschreibung des kardialen Risikos nach Intubationsnarkose bei Bauchaortenaneurysma (BAA)-Operationen