

- 170 G. Marggraf, N. Pizanis, M. Kamler, V. Milekhin, K. Tsagakis, H. Jakob: Early percutaneous tracheostomy after cardiothoracic surgery: A single center experience
- 170 H. Mende, M. Fischer, J. Martin: Sedierung und Analgesie auf deutschen Intensivstationen – Wie wird es wirklich gemacht?
- 171 E. Michael, M. Stevens, P. Lipfert: Akzidentelle direkte Punktion der Pulmonalarterie beim Versuch der zentralvenösen Katheteranlage
- 171 T. Mieth, J. Bretschneider, I. Dornberger, T. Fritzsche, R. Kuhly, S. Tettenborn, C. Spies, T. Volk: Untersuchung zu Häufigkeit und Management von schwierigen Atemwegen
- 172 A. M. Morin, T. Koch, L. H. J. Eberhart, C. Kill, H. Wulf: Sind Stimulationskatheter der konventionellen Technik bei der Platzierung von Nervus Femoraliskathetern überlegen? Eine randomisierte, kontrollierte Untersuchung
- 173 A. M. Morin, R. Niestolik, V. E. Ruf, H. Wulf, L. H. J. Eberhart: Risikofaktoren für bakterielle Katheterbesiedelungen in der Regionalanästhesie
- 173 N. Mueller, J. Mast T, S. Friese, C. Spies, I. Rundshagen: Nervus medianus-evozierte Potentiale, Narcotrend und Bispektralindex während Sedierung mit Propofol: Differenzierung von Wachheit und Bewusstlosigkeit
- 174 J. Müller, J. Birnbaum, J. Feller, Ch. Lehmann, C. Spies: Einfluss von N-Acetylcystein in Kombination mit Tirilizad Mesylat auf die mesenteriale Leukozytenadhärenz und auf Interleukinspiegel während experimenteller Endotoxinämie
- 174 K. H. Muggenthaler, M. Neuf: Einführung eines Kindernotarztdienstes in einer ländlichen Region in Bayern
- 175 T. Neumann, H. Dahl, T. Holzmann, C. Spies, A. Helander: Ethylglucuronid im Serum bei Traumatpatienten als Marker eines vorausgegangenen Alkoholkonsums
- 175 T. Neumann, B. Neuner, E. Weiß-Gerlach, C. Spies: „Readiness To Change“-Stadium und der Effekt einer computergestützten interaktiven Risikoanalyse bei verunfallten Patienten mit riskantem Alkoholkonsum
- 176 B. Neuner, E. Weiss-Gerlach, T. Neumann, G. Siebert, C. Spies: Präferenzen hinsichtlich einer „Partizipativen Entscheidungsfindung“ und soziale Ungleichheiten bei jungen, verletzten Patienten einer chirurgischen Rettungsstelle
- 176 K. Niewińska, W. Poradowska-Jeszke, J. Sokołowski, J. Jakubaszko: Alcohol level measurement is not a reliable diagnostic tool for alcohol abuse assessment in children and adolescents
- 177 P. Panousis: Effekte epiduraler Applikation von Ropivacain auf die endtidale Konzentration von Desfluran unter kontinuierlicher Überwachung der Narkosetiefe mit BIS® und Narcotrend™ - eine randomisierte, doppelblinde, kontrollierte Studie
- 178 D. Pavlovic, K. Meissner, T. Iber, J. Roesner, Ch. Mutz, Ch. Layher, Ch. Lehmann, M. Wendt: Bi-directional venturi pump can provide satisfactory transtracheal lung ventilation during more than 1 hour in 40kg pigs
- 178 G. Pfeiffer: Periphere Regionalanästhesie – von der Patientenzufriedenheit zum Klinikbenefit
- 178 S. N. Piper, K. D. Röhm, G. Härtel, C. Fresquet, J. Boldt, S. W. Suttner: PONV-Prophylaxe bei Progenie-Operationen mit postoperativer Kieferverdrahtung. Eine Placebokontrollierte Vergleichsstudie zwischen Dolasetron und Droperidol
- 179 O. Plattner, A. Bacher, G. Mancusi: The new flex tip tube versus a standard endotracheal tube for fiberoptic nasotracheal intubation
- 180 K. Priem, A. Wiese, C. Raimer, L. Dirkmorfeld, G. Matziolis, J. Birnbaum, T. Volk: Vergleich zwischen Psoas-Kompartiment/ Ischiadicusanalgesie (PIK), kombinierter Spinal- und Epiduralanästhesie (CSE) und ausschließlicher patientenkontrollierter Piritramidgabe zur postoperativen Analgesie nach alloplastischem Kniegelenkersatz
- 180 N. Rahe-Meyer, M. Winterhalter, J. Zuk, S. Piepenbrock: A new tube swivel connector with check valve reduces narcotic gas exposition concerning intraoperative bronchoscopy and bronchial suction
- 181 J. Raitz: Gibt es Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit des Patienten mit der Prämedikation und dem Ausbildungsstand des prämedizierenden Anästhesisten?
- 181 M. Reinhold, J. Werner, C. Mangler, Th. Hachenberg: Remifentanyl - Ein sicheres Verfahren zur Schmerztherapie nach thorakoskopischer Thymektomie bei Myasthenia gravis
- 182 K. D. Röhm, H. Bauer, S. N. Piper, J. Boldt: Seltene Nebenwirkung nach intrathekalem Bupivacain 0,5%: Fallbericht eines passageren Conus medullaris-Syndroms nach unkomplizierter Spinalanästhesie