

Penizilline und ASS auf nüchternen Magen

HAMBURG (me) - Mit viel Wasser auf nüchternen Magen geschluckt, wirken Azetylsalicylsäure (ASS) und einige Antibiotika am besten. Theophyllin wiederum sollte zwei bis drei Stunden nach dem Essen eingenommen werden. Die wichtigsten Beispiele für Interaktionen mit Nahrungsmitteln und Getränken → 9

Bessere Praxis durch Patientenbefragungen

KARLSRUHE (jb) - Wer die Qualität der eigenen Praxis verbessern will, sollte keinesfalls vergessen, die Meinung seiner Patienten einzuholen: Entsprechende Fragebögen sind regelmäßiger Bestandteil jedes Qualitätsmanagements. Tipps für Inhalt und Gestaltung einer aussagekräftigen Umfrage → 14

Published by
Reed Business Information

D-82152 Planegg

Axiom Deutschland Services GmbH & Co.KG
Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt

01385

B01045#02247985#028

Deutsche Zentralbibliothek
für Medizin

Ulmer Str. 60

50931 Köln

ZS. A
533/x

ZB MED

geschraubt und Mindeststandards für Qualifikation und Leis-

ärzte bedeutet dies, dass sie entweder in ihre Ultraschallgeräte

der Republik mal warm a

Süßes Geheimnis um Ulkus

Antibiotika, Débridement, modernste Wundversorgung, binnen 14 Monaten Therapiekosten von 325 000 Euro. Nachdem diverse Ärzte mit ihrer Heilkunst an diesem diabetischen Ulkus (Bild) gescheitert waren, erzielte ein als Brot-aufstrich bekanntes Hausmittel verblüffende Erfolge → 10

me / Foto: UW



Eiweiß-Elektrophorese korrekt entschlüsselt

MÜNCHEN (me) - Ein Liter Serum enthält etwa 60 Gramm Eiweiß, die sich auf verschiedene Gruppen verteilen, vom Albumin bis zum Gamma-Globulin. Der prozentuale Anteil dieser Fraktionen am Gesamt-Eiweiß lässt sich der Serum-Elektrophorese entnehmen. Diese wird heutzutage am häufigsten als Screening-Untersuchung eingesetzt.

Die größte praktische Bedeutung ist dem Aufspüren von Paraproteinen beizumessen. So genannte monoklonale Gammopathien - entsprechend einer scharfen, spitzen Zacke in der Gamma-Zone - können auf Plasmozytome, Multiple Myelome oder Immunozytome hinweisen. Ande-

rerseits besitzen sie bei vielen älteren Patienten keinen Krankheitswert.

Abhängig vom Ausgang anderer Untersuchungen genügt es unter Umständen, derartige Befunde in regelmäßigen Intervallen zu kontrollieren.

Ein weiterer charakteristischer Befund sind polyklonale Gammopathien, die sich als diffuses, breites unscharfes Band zu erkennen geben. Dahinter stecken in den meisten Fällen reaktive oder entzündliche Prozesse, beispielsweise Virushepatitiden oder rheumatoide Arthritiden.

Was sich aus der Eiweiß-Elektrophorese alles ableiten lässt, lesen Sie auf → 7

ÄP-F... weit

MÜNCHEN
tei werden
warum?"
LICHE PRA
Umfrage i
dergelasse

Die Kolle
sollten bei
gesundheit
und Pläne
könnte die
gen, die tä
kungen vo
schen Ent
tiert sind?

In den e
ben sich so
und Kolleg
meter bete