

Redaktionstipp:

„HNO“ bietet in der Rubrik „CME“ umfassende und praxisorientierte Fortbildungsbeiträge mit der Möglichkeit, je 3 CME-Punkte (CME = Continuing Medical Education) zu erwerben.

An jeden Beitrag schließen sich 10 CME-Fragen an, die ausschließlich online unter **CME.springer.de** beantwortet werden können.

Eine entsprechende Teilnahmebescheinigung zur Vorlage bei der zuständigen Landesärztekammer können Sie dort herunterladen, da wir für Sie Ihre Fortbildung dokumentieren.

Für Fragen und Anmerkungen steht Ihnen unser CME-Helpdesk unter cme@springer-sbm.com gerne zur Verfügung.

**HNO-Praxis ENT practice**

- C. Kothe · G. Schade · S. Fleischer · T. Grundmann · M. Hess
Erfahrungen mit der intraoperativen Prednisolongabe bei der Thyreoplastik Typ I nach Isshiki 651
 Experiences with intraoperative application of prednisolone during Isshiki type I thyroplasty

Phoniatrie und Pädaudiologie Phoniatics and Pedaudiology

- T. Helge · E. Werle · M. Barnick · C. Wegner · B. Rühle · G. Aust · R. Rossi
Sequenzielles Neugeborenen-Hörscreening (TEOAE/AABR) reduziert Recall-Rate. Erfahrungen in einem Berliner Perinatalzentrum 655
 Two-tier screening process (TEOAE/AABR) reduces recall rates in newborn hearing screening

CME Weiterbildung · Zertifizierte Fortbildung Continuing education

- D.-M. Denk · W. Bigenzahn
Management oropharyngealer Dysphagien. Eine Standortbestimmung 661
 Management of oropharyngeal dysphagia. Current status
- Fragen zur Zertifizierung** 672
 Questionnaire

Verschiedenes Miscellaneous

- Fachnachrichten · News** 611, 617, 636, 650, 660
- Buchbesprechung · Book review** 654
- Termine · Forthcoming meetings** 675

Vorschau auf Heft 8 · August 2005

Änderungen vorbehalten

- Untersuchungen der Riechschleimhaut von anosmischen Patienten nach Schädel-Hirn-Trauma
- Die vestibulär-evozierten Muskelpotentiale in Abhängigkeit vom nervalen Ursprung und der Lage eines Akustikusneurinoms
- Messsystem zur Erfassung der binaural masking level difference (BMLD) bei Kindern
- Verkalkung der Falx cerebri. Ein pathognomonisches Zeichen beim Gorlin-Goltz-Syndrom
- Erfassung der Veränderungsmotivation bei Tinnituspatienten.
- Qualitätskontrolle audiologischer Befunde einer universitären phoniatisch/pädaudiologischen Einrichtung am Beispiel der Begutachtung der beruflichen Lärmschwerhörigkeit
- Postoperative Schmerztherapie nach Tonsillektomie im Kindesalter
- Naturheilkundliche Therapie der akuten Otitis media
- Erregerspektrum der akuten Rhinitis/Sinusitis und Resistenzlage
- Einfluß der Magnetresonanztomographie auf Oberlidimplantate