



SCHWERPUNKT

ONKOLOGIE

30 bis 40 Prozent der Mammakarzinom-Patientinnen entwickeln nach einer kurativen Therapie Metastasen. Welche Behandlungsstrategien in diesem Fall zur Verfügung stehen, lesen Sie im Schwerpunkt

ab Seite **34**

Therapie

Potente Waffen gegen das metastasierende Mammakarzinom34

Diagnostik

Mammographie und Mammasonographie:
Bildgebende Verfahren bringen Klarheit39

Prävention

HPV-Typen 16 und 18 im Visier – Impfung bald Realität.....44

Forschung

Innovative Substanzen, neue Kombinationen.....46

Fragebogen zur Zertifizierten Fortbildung

Sammeln Sie bis zu 3 CME-Punkte.....48

Kunsttherapie


Krankheit kreativ bewältigen.....49

Krebsregister

Der schwierige Weg zu validen Zahlen.....50

DMP Brustkrebs

Programminhalte jetzt inhaltlich überarbeitet.....51



Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Gynäkologie finden Sie auf unserer Homepage unter www.aerztlichepraxis.de

Fotos: Hebold, Superbild, Bilderbox, ABDA Titelbild: Sittek

Bella HEXAL 35[®]

Zur hormonellen Aknetherapie.

- Bioäquivalent zu Diane[®] -35
- 3 Packungsgrößen
- Preisvorteil bis **28%***

*gegenüber Diane -35

Arzneimittel
Ihres Vertrauens



Bella HEXAL 35[®] 2 mg/0,035 mg, überz. Tabl.: Wirkst.: Cyproteronacetat /Ethinylestradiol. **Zusammensetzung:** Jede Tabl. enth. 2000 Mikrogramm Cyproteronacetat u. 35 Mikrogramm Ethinylestradiol. Tabl.-kern: Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph.Eur.), Maisstärke, Povidon K25, Talkum. Tabl.-umhüll.: Ca-Carbonat, Glycerol 85 %, Macrogol 6000, Montanglycolwachs, Povidon K90, Sacrose, Talkum, Farbst. E 171, E 172. **Anwendungsgeb.:** Bella HEXAL 35 ist nur indiz. zur Anwend. bei Frau. zur Behandl. von schwer. Akne, die auf eine orale Langzeit-Thera. mit Antibiotika nicht anspricht u. bei mäßig schwer. Hirsutismus. **Gegenanz.:** Überempfl., Schwangersch., Stillz., schwer. Lebertunkt.-stör., Gelbsucht, anhalt. Juckreiz währ. einer früh. Schwangersch., Dubin-Johnson-Syndrom, Rotor-Syndrom, besteh. Lebertumor. od. Lebertumor in der Anamnese, besteh. od. vorausgegang. arteriell. od. venöse thrombotische od. embolische Prozesse sowie dazu disponier. Zustände, wie z. B. Stör. des Gerinnungsprozesses, Herzklappenerkrank. u. Vorhofflimmern, Sichelzellenanämie, Mamma- od. Endometriumkarzinom, Verdacht auf Mamma- od. Endometriumkarzinom bzw. diese Krankh.-bild. in der Anamnese, schwer. Diab. mell. mit Gefäßveränd., Fettstoffwechselstör., Herpes gestationis in der Anamnese, Otoklerose mit Verschlecht. währ. der Schwangersch., ungeklär. anormale Vaginalblut., schwer. Hypertonie, Migräne mit Aura. **Nebenwirk.:** Depress. Verstim., Kopfschmerz., verstärkt. epilept. Anfälle, Seh- u. Hörstör., and. Wahrnehm.-stör., erhöh. Risiko für eine venöse Thromboembolie, arteriell. Thrombose einschließl. Hirn- u. Myokardinfarkt, Subarachnoidalblut., Blutdruckanstieg, Magenbeschwerd., Übelk., Erbrechen, gutart. od. bösart. Lebertumor, lebensgef. Blut. i. d. Bauchhöhle, Chloasma, Brustkrebs, Absond. aus der Brust u./od. Brustvergröß., Brustspannen, Libidoveränd., Redukt. des Menstrationsflusses, fehl. Menstruation, Zwischenblut., Veränd. des Körpergewicht., schlecht. Verträglichk. von Kontaktlinsen, Einfluss auf bestimmte Labortests einschließl. biochem. Parameter der Leber-, Schilddrüsen-, Nebennieren- und Nierenfunkt., Plasmaspiegel von Trägerproteinen u. Lipid-/Lipoprotein-Fractionen, Parameter des Kohlenhydratmetabolismus, Parameter der Gerinnung u. Fibrinolyse, Anstieg der Sedimentationsrate des Blutes, von Kupfer u. Eisen im Serum sowie der alkalischen Leukozyten-Phosphatase. Enth. Lactose u. Sacrose. Weit. Einzelh. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/301357 **Stand:** Juli 2004 **HEXAL AG,** 83607 Holzkirchen <http://www.hexal.de>