Titelbild: Hartschnittpräparat Unterkieferer Molar; Schmelzkaries in den Fissuren mit Überschreitung der Schmelz-Dentin-Grenze; unterhalb der rot eingefärbten Dentinläsion streifiger Verlauf der Zone der Sklerosierung als Ausdruck der intensivierten Mineralabscheidung intra- und peritubulär der betroffenen Odontoblasten.
Foto: Prof. Dr. V. Stachniss; Philipps Universität Marburg; Leiter Abteilung f. Zahnerhaltungskunde

Praxis

Der Umgang mit der Okklusion im Praxisalltag: Einschleiftherapie im natürlichen Gebiß Teil 1: diagnostisches Einschleifen — Ion Coca, Johannes Hörschgen — 362

Vollkeramische Restauration - Eine Übersicht — Sven Reich, Manfred Wichmann, Ulrich Lohbauer — 370

Myoarthropathien des Kausystems: V - Kiefergelenkgeräusche: Knacken und Reiben — Jens C. Türp, Hans J. Schindler — 374

Leistungsvergleich

Konventionell keramisch verblendbare Goldlegierungen mit goldgelber Farbe — Rudolf Wagner — 380

Leistungsvergleich „Aufbrennlegierungen" — 382

Steuern Recht Finanzen

Gesundheitskarte: Was ist der Anreiz für die Ärzte? — 388

Befundbezogener Festzuschuß - § 55 Zahnersatzabrechnung 2005 — Kerstin Salhoff — 390

Veranstaltungen

Langzeitstudie belegt: Kompomer zur direkten Füllungstherapie erfolgreich — 402

Wahlprogramm Gesundheit - Neuwahlen 2005 — 403

Alkohol in Mundspül-Lösungen nicht erforderlich — 404

Streptococcus mutans-Genchip entwickelt — 405

„Design ist mehr als eine schöne Hülle" — 406

Werberecht, ein Thema für alle Zahnärzte! — 408

Anerkennung von Berufsqualifikationen sichert deutsche Qualitätsstandards europaweit — 409

Rubriken

Editorial — 359
Inhaltsverzeichnis — 360
BDDH aktuell — 410
Dental-Ticker — 412
Impressum — 414

Produkte

Neuheiten, Herstellerinformationen — 398