

Cochrane Library

- 1348** J. Costa, C. Espírito-Santo, A. Borges, J.J. Ferreira, M. Coelho, P. Moore, C. Sampaio
Botulinumtoxin Typ A zur Behandlung der zervikalen Dystonie
- 1349** J. Costa, C. Espírito-Santo, A. Borges, J.J. Ferreira, M. Coelho, P. Moore, C. Sampaio
Botulinumtoxin Typ B zur Behandlung der zervikalen Dystonie

Der PRAXIS-Fall

- 1351** R. Melzer
Lufthunger und schädlicher Wissensdurst

PRAXIS-Journal Club

- 1355** M. Puhan
Entscheidungshilfen fördern das «shared decision making» bei Patientinnen mit Mammakarzinom vor einem operativen Eingriff
- 1357** K. Eichler
Häufigkeit und Konsequenzen von Uterusrupturen bei erneuter Geburt nach vorausgegangener Sectio

Rubriken

- 1359** Zeitschriftenreferat
1365 Impressum
UG 3 Vorschau

Magazin

- 1365** Mediziner-Literatürrätsel
1366 Medizinhistorisches: Wie Biochemie öffentlich wurde, oder: Robert Daniel Lawrence und sein «diabetisches ABC» (1900–1945)

Andreafol®**schützt vor NRD****BAG und DACH empfehlen ...**

allen Frauen, die schwanger werden möchten oder könnten
zusätzlich zu folsäurereicher Nahrung
die kontinuierliche Einnahme
von 0,4 mg Folsäure pro Tag in galenischer Form¹⁾
nichts mehr, nichts weniger und nichts anderes

1) Bulletin des Bundesamts für Gesundheitswesen 8/2001 und 6/2003; DACH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 2000
Z: Folsäure 0.4 mg; I: Vorbeugung von Neuralrohrdefekten; D: 1 T. tägl.; KI: Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoff; UAW: selten allergische Reaktionen oder leichte gastrointestinale Störungen; IA: v.a. Folsäureantagonisten, Antiepileptika; P: 30 und 90 T; Verkaufskategorie C. Andreafol AG, 4054 Basel. Mehr im Kompendium