




Schulung

Das Ziel des Freiburger Interventionsprogramms zur ambulanten Therapie der Adipositas im Kindesalter (FITOC) ist es, die Kinder einerseits zum Abnehmen zu bringen, andererseits ihr Selbstwertgefühl zu verbessern.

197

Wachstumsstörung

Rund 85% der Kinder mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen erreichen die für sie ermittelte genetische Endgröße nicht. Grund für die Wachstumsstörung sind Malnutrition, der Entzündungsprozess sowie die Gabe von Glukokortikoiden.



212

Pfändung

Arbeitslohn ist nicht uneingeschänkt pfändbar. Der Arzt als Arbeitgeber kann sich bei Nichtbeachtung der Pfändungsfreigrenzen deshalb schadensersatzpflichtig machen.

214

- 197** — Interventionsprogramm für adipöse Kinder
In kleinen Schritten zum bewussten Umgang mit dem Körper
Ulrike Korsten-Reck, Annette Schneider
- 200** — Adipositas bei Kindern
Referenzsysteme und Normdaten im Vergleich
Jannie Weiten, Volker Hesse

Kongress kompakt

- 208** — 35. Kinder- & Jugendärztetag, Berlin 2005:
75.000 Varizellenkranke sind zu viel
- 210** — PEI: Impfungen sind sicher
- 212** — Aktuelle Gastroenterologie, Freiburg 2005:
Wachstumsstörungen bei Kindern mit CED sind häufig

Arzt und Recht

- 214** — Lohnpfändungen eines Mitarbeiters
Der Arzt als Arbeitgeber kann haften
Heike Jablonsky

Bildbetrachtung

- 220** — Franz von Lenbach (1836–1904)
Malerfürst der Gründerzeit
Joachim Gunkel

Wir bitten um freundliche Beachtung des Kongress Report aktuell „Hohe Anforderungen an moderne Antihistaminika“, der diesem Heft beiliegt.

Chefredaktion

Dr. med. Ulrich Mutschler
Klinikum Hildesheim
Weinberg 1
31134 Hildesheim

Dr. med. Hartmut Koch
St.-Marienhospital
Marienstr. 6–8
49377 Vechta

Verlagsredaktion

Dr. Nicola Zink
Urban & Vogel Verlag
Neumarkter Str. 43
81673 München
E-Mail: zink@urban-vogel.de

! Besuchen Sie uns online:
● www.paediatric-hautnah.de

Organschaft

pädiatrie hautnah ist offizielles Organ des Netzwerkes Interdisziplinäre pädiatrische Dermatologie e.V. (NipD)

NipD im Internet unter:
www.hautnet.de

ratter
mg, 4
pseln.
hydroc
stzung
mg, 1
der 60 n
oxetin
estanc
Stärke
odecyls
shwarz
ck, sch
itandio
xid E
132. A
ehand
eitsde
törung
Jahre
eil ein
ungsp
weise
ische
ainsch
und
dung
liche
zeldo
ohne
werd
stelle
chen
halbe
gen
oder
Dos
per
Erh
form
den
wa
die
lun
me
Er
für
wa
an
A
o
st
m
d
z
C
P
H