

- 1402** C. Becker, A. Luginbühl, U. Pittl, R. Schlienger
Laktatazidose in Assoziation mit Metformin bei einer Patientin mit vorbestehenden Risikofaktoren

Der PRAXIS-Fall

- 1409** S. Blaser, C. Luder, R. Weimann, E. Odenheimer, P. Netzer, J. Greeve, U. Schiemann
61-jährige Patientin mit langjähriger Diarrhoe und reaktiver depressiver Verstimmung

PRAXIS-Journal Club

- 1413** M. Puhan
Quetiapin und Rivastigmin unwirksam und gefährlich zur Behandlung der Agitation bei Patienten mit Alzheimer-Demenz
- 1415** M. Puhan
Donepezil erzielt vermutlich keine klinisch relevante Wirkung bei Alzheimer

Rubriken

- 1418** Zeitschriftenreferat
1408 Impressum
UG 3 Vorschau

Magazin

- 1419** Komplementärmedizin
1421 Mediziner-Bilderrätsel

Andreafol®



schützt vor NRD

BAG und DACH empfehlen ...

allen Frauen, die schwanger werden möchten oder könnten
 zusätzlich zu folsäurereicher Nahrung
 die kontinuierliche Einnahme
von 0,4 mg Folsäure pro Tag in galenischer Form¹⁾
 nichts mehr, nichts weniger und nichts anderes

1) Bulletin des Bundesamts für Gesundheitswesen 8/2001 und 6/2003; DACH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 2000
 Z: Folsäure 0.4 mg; I: Vorbeugung von Neuralrohrdefekten; D: 1 T tägl.; KI: Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoff; UAW: selten allergische Reaktionen oder leichte gastrointestinale Störungen; IA: v.a. Folsäureantagonisten, Antiepileptika; P: 30 und 90 T; Verkaufskategorie C. Andreabal AG, 4054 Basel. Mehr im Kompendium