

## Inhaltsverzeichnis

Akute, thrombotische Verschlüsse der Becken- und Beinarterien bei zwei gesunden Männern mit stark erhöhtem Lp(a)	V 4.4
Ambulante Interventionelle Angiologie - Erfahrungen nach den ersten 1000 Kathetereingriffen	PS 2.11
Analysis of FXIII A- subunit Val34Leu polymorphism in patients with peripheral arterial occlusive disease treated with aspirin	V 8.7
Aneurysmata spuria: Behandlungsstrategien, Thrombininjektion	V 6.5
Angiogenetische Effekte von C-reaktivem Protein beruhen auf NAD(P)H-Oxidase abhängiger Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies	V 2.7
Autologe Knochenmarkstransplantation zur Induktion der Angiogenese bei kritischer Extremitätenischämie: erste Erfahrungen	V 2.1
Beeinflussung der makro- und mikrovaskulären endothelialen Dysfunktion bei akuter Hyperhomocysteinämie durch Thiol-Antioxidantien aus Knoblauch-Extrakt – eine placebokontrollierte doppelblinde Crossover-Studie	V 7.3
Case Report: Dilatative Angiopathie	PS 1.3
Comparison of oscillometric and tonometric derived pulse wave velocity	V 1.3
Correlations of anticardiolipin assays of different manufactures: urgent need for better standardization	V 8.3
Cutaneous delayed-type IV-hypersensitivity reaction (DTH) to heparin and heparin-induced thrombocytopenia type II (HIT) – similar clinical picture, different pathogenesis	V 8.5
Danaparoid in a pregnant patient with former HIT, homozygous factor V Leiden (FVL) mutation and a history of pregnancy losses	V 4.9
Das Raynaud-Phänomen der Mamille: seltene oder wenig beachtete Manifestation des Raynaud-Syndroms?	PS 1.6
Design und Methodik der getABI-Studie	SY 8.1
Deutlich erhöhte 3-Jahresmortalität bei Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit	SY 8.6b
Die Behandlung des Aneurysma spurium nach interventionellen Eingriffen: Erfahrungen mit der Thrombininjektion	V 6.4
Die ContOP - Studie: Schweizer Ergebnisse einer multizentrischen, offenen, prospektiven, blockrandomisierten Studie mit einem hydroaktiven silberhaltigen Schaumverband versus Standardbehandlung beim Ulcus cruris	PS 1.14
Die Kälteagglutininkrankheit als Erstsymptom eines Morbus Waldenström	V 4.7
Die Peak-Velocity-Ratio zur Quantifizierung postinterventioneller Stenosen bei transradialer Koronarangiographie und -intervention	PS 2.5
Die Wirkung einer Einzeldosisgabe von Fluvastatin und Atorvastatin auf die arteriosklerotische Nanoplaquebildung bei Patienten mit Typ 2-Diabetes	PS 2.1
Digitale Nekrosen, Raynaud-Phänomen und cerebrale Vaskulitis bei Hepatitis C-assoziiierter Eosinophilie : ein Fallbericht	PS 1.8
Duplexsonographie im distalen poststenotischen Gefäßbereich zur Schweregradbeurteilung der PAVK	V 1.6
Effekte additiver PGE-1-Medikation während der PTA auf die Mikrozirkulation der Extremität	V 10.5
Eine Modifizierung der Berechnung des Knöchel-Arm-Index führt zu einer höheren Sensitivität in der Diagnose der Peripheren Arteriellen Verschlusskrankheit	PS 2.15
Eine Modifizierung in der Berechnung des Knöchel-Arm-Index führt zu einer höheren Sensitivität in der Diagnose der Peripheren Arteriellen Verschlusskrankheit bei Diabetikern	V 1.2
Eine neue oszillometrische Methode zur Bestimmung des Gefäßalters	V 1.4
Einfluss der Carbofilm Beschichtung auf die Restenoserate nach renaler Stent-Angioplastie	V 3.5
Einfluss kardiovaskulärer Risikofaktoren auf das Verteilungsmuster atherosklerotischer Läsionen in den peripheren Arterien	H 7.4
Einfluss prozeduraler Faktoren, kardiovaskulärer Risikofaktoren und Marker der systemischen Inflammation auf die Restenoserate nach femoro-poplitealer Katheterintervention	V 3.4
Einsatz eines Hydropolymerverbandes bei der Behandlung diabetischer Fußläsionen in der ambulanten Versorgung	V 10.4