

Maligner Hypertonus mit rezidivierendem Lungenödem und bei einer 60 jährigen Dialysepatientin mit einer hochgradigen Nierenarterienstenose bei Einzelniere	V 4.8
Metalloproteinasen als prädiktive Marker für Plaquestabilität von Stenosen der A. carotis	V 7.1
Molecular weight determines the frequency of delayed type IV hyper-sensitivity reactions (DTH) to heparin and synthetic oligosaccharides.	V 8.4
Morbus embolicus mit Lungenarterienembolie, Nieren-, Milz- und Myokardinfarkt sowie cerebralem Insult bei offenem Foramen ovale	PS 1.9
Multivariable Risikostratifizierung bei symptomatischer PAVK	V 2.2
Neoangiogenese aus adulten Stammzellen	V 2.6
Ödeme der oberen Extremitäten nach Axillarevision bei Mammakarzinom	V 11.8
Patientenzufriedenheit nach Varizen OP - Ein Benchmarking-Projekt innerhalb der ANG.	PS 2.3
PAVK-Patienten sind in Deutschland unterbehandelt: Schlussfolgerungen aus getABI	SY 8.6a
Perfusionsausfälle an Arm und Hand nach transradialer Koronarangiographie oder -intervention?	V 6.2
Perfusionsmessung der Wadenmuskulatur mit Ultraschall-Kontrastmittel bei pAVK – Einfluss von Diabetes mellitus	V 1.7
Periphere Minderperfusion koronarkrankter Patienten während externer Gegenpulsation	V 2.3
Perkutane Rekanalisation von langstreckigen, chronischen Beckenarterienverschlüssen: primär und Langzeitergebnisse nach 4 Jahren.	V 3.2
Persistent Parvovirus B19 infections are not associated with peripheral arterial occlusive disease	H 7.5
Placenta Growth Factor Expression in humanen arteriosklerotischen Karotisplaques ist assoziiert mit Plaqueinstabilität via Inflammation	H 3.5
Prävalenz der pAVK in Deutschland – Ergebnisse der Heinz Nixdorf Recall Studie	H 7.3
Proof-of-Concept zum Einfluß von Aspirin und Clopidogrel auf die Gehstrecke von Patienten mit Claudicatio intermittens: doppelblinde, randomisierte, multinationale Vergleichsstudie	V 2.4
PTA-Register (PTAReg)	V 6.6
Rebound nach Absetzen einer Langzeit-Antikoagulation bei VTE: Effekte einer 4-wöchigen Prophylaxe mit NMH auf die Rezidivrate	V 11.7
Register zur Erfassung von Komplikationen unter Vitamin-K-Antagonisten	V 8.8
Rekanalisation von iliakalen TASC C und D Läsionen: Ergebnisse nach 4 Jahren Follow-up.	V 3.1
Reproducibility of the Diagnosis of Deep Vein Thrombosis Established in Video Documents of Asymptomatic Patients after Hip and Knee Replacement	H 3.2
Riesenzellarteriitis der femoropoplitealen und cruralen Strombahn bei 4 Patienten mit rasch progredienter pAVK	V 4.3
Risikofaktoren für eine Thrombose bei Tumorpatienten	V 11.2
Risikokonstellation postmenopausaler Frauen mit PAVK	PS 2.12
Schmerzmanagement bei der Behandlung des chronischen Ulcus cruris	PS 1.12
Selektive UPA-Inhibition vermindert die Neointimabildung in einem tierexperimentellen Restenosemodell	V 7.7
Serologische Marker zerebraler Nekrosen nach Carotis-PTA	V 6.1
Sildenafil verbessert die kutane Mikrozirkulation bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung	PS 1.15
Stellenwert der Hemobahn/Viabahn in der Stufentherapie chronischer Verschlüsse der Arteria femoralis superficialis	PS 2.2
Stentimplantation in eine postduktale Aortenisthmusstenose mit postinterventionellem gedecktem Dissekat und Stentfraktur im Verlauf	PS 1.7
Substantielle Erhöhung der Mortalität bei Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit: 3-Jahres-Ergebnisse der getABI Studie	H 7.2
Systemische Aspergillose mit Gefäßruptur nach kombinierter Nieren-/ Pancreastransplantation- Fallbericht und Literaturübersicht	PS 1.5
Takayasu-Arteriitis mit atypischer Lokalisation: ein Fallbericht	V 4.2
Therapie isolierter Unterschenkelmuskelvenenthrombosen mit niedermolekularem Heparin - randomisierte, prospektive Studie	V 11.6
Therapieoption der Stamm- und Seitastvaricosis mittels percutaner endovenöser Lasertherapie (810 Diodenlaser)	PS 2.6