

Therapiestrategie zur effektiven, evidenzbasierten und kostenorientierten antibiotischen Behandlung des ischämischen und neuropathischen diabetischen Fußsyndroms	V 10.3
Thromboseprophylaxe – Signifikante Senkung der Thromboserate bei elektiven Eingriffen in der Hirntumorchirurgie unter Verwendung der niedermolekularen Heparine (NMH) Certoparin und Nadroparin perioperativ	V 11.1
Überstimulation und Jugularvenenthrombose	V 11.3
Ulcus cruris venosum - warum "feuchte Wundbehandlung"	V 11.5
Untersuchung zur Aufwertung der konservativen Behandlung der AVK	PS 1.10
Venöse Portsysteme - Analyse und Prophylaxe von Infektionskomplikationen	PS 2.14
Veränderung der Lebensqualität bei Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit durch medikamentöse Therapie	PS 1.13
Vergleich unterschiedlicher Verfahren zur Diagnostik der kritischen Extremitätenischämie bei Patienten mit AVK und bei Diabetikern mit Mediasklerose .	PS 2.10
Wundmanagement und Prinzipien der konservativen und interventionellen Behandlung beim Diabetischen Fuß-Syndrom	PS 1.1