



SCHWERPUNKT

ZYKLUSSTÖRUNGEN



28 Tage sind keineswegs die Regel: Auswertungen der Deutschen Zyklusdatenbank ergeben hier eine erhebliche Streubreite. Tipps für die Diagnostik von tatsächlichen Zyklusstörungen finden Sie im Schwerpunkt

ab Seite **30**

Menstruationsstörungen

- 28 Tage sind nicht die Regel –
 Tipps für die Basisdiagnostik von Zyklusstörungen30
 Oligo- und Amenorrhö post-pill32

Menstruelle Migräne

Kollege Prof. Dr. Hans-Joachim Ahrendt stellt Therapieoptionen vor ...35

Polyzystisches Ovarialsyndrom

- Krankheit zwischen den Disziplinen36
 Problem Kinderwunsch37
 Problem habituelle Fehlgeburten38

Uterusmyome

Messer und Laser gegen überflüssiges Gewebe39

Fragebogen zur Zertifizierten Fortbildung


Sammeln Sie bis zu 3 CME-Punkte41

Pubertät

- Bühne frei für die Zyklus-Show42
 Beratungskompetenz für junge Mädchen42

Zyklusmonitoring

Auf die natürlichen Zeichen des weiblichen Körpers achten43



Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Gynäkologie finden Sie auf unserer Homepage unter www.aerztlichepraxis.de

Fotos: Superbild, Archiv, Fotex, Lannert. Titelbild: Fotex

Bella HEXAL 35[®]

Zur hormonellen Aknetherapie.

- Bioäquivalent zu Diane[®]-35
- 3 Packungsgrößen
- Preisvorteil bis **28%***

*gegenüber Diane[®]-35

Arzneimittel
Ihres Vertrauens



Bella HEXAL 35: 2 mg/0,035 mg, überz. Tabl.; Wirkst.: Cyproteronacetat/Ethinylestradiol; Zusammensetz.: Jede Tabl. enth. 2000 Mikrogramm Cyproteronacetat u. 35 Mikrogramm Ethinylestradiol; Tabl.-kern: Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph. Eur.), Maisstärke, Povidon K25, Talkum; Tabl.-umhüll.: Ca-Carbonat, Glycerol 85 %, Macrogol 6000, Montanglycolwachs, Povidon K90, Sacrose, Talkum, Farbst. E 171, E 172; **Anwendungsgeb.:** Bella HEXAL 35 ist nur indiz. zur Anwend. bei Frau. zur Behandl. von schwerer Akne, die auf eine orale Langzeit-Thera. mit Antibiotika nicht anspricht u. bei mäßig schwerer Hirsutismus. **Gegenanz.:** Überempf., Schwangersch., Stillz., schwerer Leberfunkt.-stör., Gelbsucht, anhalt. Juckreiz währ. einer früh. Schwangersch., Dubin-Johnson-Syndrom, Rotor-Syndrom, besteh. Lebertumor, od. Lebertumor in der Anamnese, besteh. od. vorausgegang. arteriell. od. venöse thrombotische od. embolische Prozesse sowie dazu disponier. Zustände, wie z. B. Stör. des Gerinnungsprozesses, Herzklappenkrankh. u. Vorhofflimmern, Sichelzellenanämie, Mamma- od. Endometriumkarzinom, Verdacht od. Mamma- od. Endometriumkarzinom bzw. diese Krankh.-bild. in der Anamnese, schwerer Diab. mell. mit Gefäßveränd., Fettstoffwechsell. Stör., Harnwegsinfekt, in der Anamnese, Otitis media, Myokardinfarkt, Subarachnoidalblut., Bluthochdruck, Magenbeschwerd., Übelk., Erbrechen, gutart. od. bösart. Lebertumor, Lebergeschw., Bluthochdruck, Chloasma, Brustkrebs, Abszess aus der Brust u. od. Brustvergröß., Brustspannen, Libidoveränd., Redukt. des Menstruationsflusses, fehl. Menstruation, Zwischenblut., Veränd. des Körpergewichts, schlecht. Verträglichk. von Kontaktlinsen, Einfluss auf bestimmte Labortests einschließl. biochem. Parameter der Leber-, Schilddrüsen-, Nebennieren- und Nierenfunkt., Plasmaspiegel von Trägerproteinen u. Lipid-/Lipoprotein-Fraktion, Parameter des Kohlenhydratmetabolismus, Parameter der Gerinnung u. Fibrinolyse, Anstieg der Sedimentationsrate des Blutes, von Kupfer u. Eisen im Serum sowie der alkalischen Leukozyten-Phosphatase; Enth. Lactose u. Sacrose; Weid. Einzel- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig; **Mat.-Nr.:** 3/301357 **Stand:** Juli 2004 **HEXAL AG**, 83607 Holzkirchen <http://www.hexal.de>