

ADHS

Das Syndrom der Aufmerksamkeits-Defizit-(Hyperaktivitäts-)Störung (AD(H)S) aus neurobiologischer, neuropharmakologischer und schulpädagogischer Sicht
Teil 2: Diagnostik – Therapie – Methylphenidat (Ritalin®)6
A. Schäfers, Th. Grund, G. Teuchert-Noodt, Bielefeld

EPILEPSIE

Oxcarbazepin interagiert nicht mit Sexualhormonen.....18

Zonisamid in der Zusatztherapie fokaler Epilepsien.....19

MORBUS PARKINSON

Optimierte Levodopa-Therapie mit Entacapon.....20

Effektive Therapie von Wearing-off-Symptomen.....21

Leitlinienbasierte Therapie mit Pramipexol22

MULTIPLE SKLEROSE

Langzeittherapie mit intramuskulär appliziertem Interferon-beta-1a.....23

Axonverlust von Anfang an: Frühe Diagnose und früher Therapiebeginn entscheidend für Krankheitsverlauf.....25

PSYCHIATRIE

Antidepressive Therapie und Phasenprophylaxe affektiver Störungen im Alter30
S. Lampen-Imkamp, C. Kollmar, H.M. Emrich, D.E. Dietrich

NEUROLOGIE

Die Bedeutung der mitochondrialen Medizin für die Neurologie (Teil 3).....38
W. Götz, Waiblingen

GERONTOANÄSTHESIE

Einfluss der Komorbidität auf die Versorgung des traumatologischen Patienten aus anästhesiologischer Sicht.....40
J. Schreiner-Hecheltjen, Essen

MIGRÄNE

Migräne-Prophylaxe mit Topiramate49

SCHMERZSYMPTOMATIK

Patientenbedürfnisse bestimmen das individuelle Behandlungsziel.....50


Optimale Opioidtherapie trotz steigendem Kostendruck51

ZNS & SCHMERZ AKTUELL.....54

ZNS & SCHMERZ PHARMA.....62

EDITORIAL3

IMPRESSUM66



Das Motiv für das Titelbild wurde uns freundlicherweise von der Fa. AstraZeneca GmbH zur Verfügung gestellt.