

Cochrane Library

- 1777** E.C. van Dalen, H.N. Caron, H.O. Dickinson, L.C.M. Kremer
Kardioprotektive Massnahmen bei Krebspatienten unter Anthrazyklin-Therapie

PRAXIS-Journal Club

- 1779** M. Puhan
Pulmonale Rehabilitation nach akuter Exazerbation einer COPD
- 1781** M. Puhan
Exazerbationen können bei ausgesuchten COPD-Patienten zu Hause behandelt werden

Rubriken

- 1789** Impressum
UG 3 Vorschau

Magazin

- 1788** Mediziner-Literaturrätsel

Mit Andreafol® beugen Sie Neuralrohrdefekten vor!

BAG und DACH empfehlen allen Frauen, die schwanger werden möchten oder könnten, zusätzlich zu folsäurereicher Nahrung die kontinuierliche Einnahme von 0.4 mg Folsäure pro Tag in galenischer Form.*



Z: Folsäure 0.4 mg. I: Vorbeugung von Neuralrohrdefekten. D: 1 Tablette täglich. KI: Überempfindlichkeit gegenüber einem Inhaltsstoff. UAW: selten allergische Reaktionen oder leichte gastrointestinale Störungen. IA: v.a. Folsäureantagonisten, Antiepileptika. P: 30 und 90 Tabletten. Verkaufskategorie C. Andreafol AG, 4054 Basel.
 Ausführliche Informationen im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz.
 *Bulletins des Bundesamtes für Gesundheit 16/1996, 8/2001 und 6/2003.
 DACH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr 2000.

Kassenpflichtig

Andreafol



C
 Ste
 Ana
 Ein
 und
 schu
 fälli
 Her
 Klei
 Abb
 Abb
 Auf
 Sie
 Nach
 sofo
 Kor
 PD
 Koo
 SGB
 Seil
 861
 © 20