


Nephektomiepräparat nach laparoskopischer Tumorektomie links, Nierenvene mit Endo-GIA versichert.

6



Radiofrequenzablation bei Nierenzellkarzinom T1N0M0. CT vor und nach RFA.

12

Nephektomiepräparat mit einem 9,5 cm langen Thrombus.

16

TITEL

- 6Laparoskopische Tumornephektomie und Nierentumorresektion – Indikation, Technik und Resultate. Klaus Jeschke, Urologische Abteilung am Landeskrankenhaus Klagenfurt
- 12Radiofrequenzablation renaler Tumore – Indikation, Technik und Resultate. Bernhard Brehmer, Andreas H. Mahnen I, Rolf W. Günther I, Gerhard Jakse, Urologische Klinik und Klinik für Radiologische Diagnostik I, Universitätsklinikum Aachen
- 16Operative Therapiestrategien beim Nierenzellkarzinom mit Beteiligung der Vena cava inferior. Axel Heidenreich, Carsten-Henning Ohlmann, Bereich Urologische Onkologie, Klinik und Poliklinik für Urologie, Klinikum der Universität zu Köln
- 22Langzeitergebnisse von systemischer Immuntherapie bei Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzinom. Olaf A. Brinkmann und Lothar Hertle, Klinik und Poliklinik für Urologie des Universitätsklinikums Münster – UKM
- 30Neue spezifische Therapieansätze beim metastasierten Nierenzellkarzinom. Michael Staehler und Michael Siebels, Urologische Universitätsklinik, Klinikum Großhadern, Ludwig Maximilians Universität, München

FORTBILDUNG

- 34Operative Techniken der Harnableitungen. Carsten-Henning Ohlmann, Udo Engelmann, Axel Heidenreich, Sektion Urologische Onkologie, Klinik und Poliklinik für Urologie, Klinikum der Universität zu Köln



KONGRESSBERICHTE

- 38Bedeutung von Docetaxel in der First- und Secondline-Therapie des NSCLC
- 39NSCLC: Überlebensvorteil durch Erlotinib
- 40Neue Aspekte in der Therapie des NSCLC
- 41Cetuximab: Eine Option für Patienten mit fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren
- 42Irinotecan erweitert therapeutische Möglichkeiten beim kolorektalen Karzinom und beim Magenkarzinom
- 43Krebsforscher für herausragende Arbeiten mit dem Deutschen Krebspreis geehrt
- 44Überzeugende Daten sprechen für frühen Wechsel auf Anti-Aromatase-Wirkstoff
- 45Auch onkologische Patienten bedürfen dringend einer Thromboseprophylaxe – stationär und ambulant
- 48AGO-Studie belegt gravierende Unterschiede in der Therapiequalität beim Ovarialkarzinom

PHARMABERICHTE

- 46Infusionspumpe FOLFusor gewährleistet sichere ambulante Therapie mit FOLFOX