

- 
- P 3.47 Neonataler Therapiebeginn mit Pamidronat bei einem Kind mit sehr schwerer Osteogenesis imperfecta: 4-jahres Verlauf  
Härtle M., Pontz B.F.; München
- P 3.48 Systemic mastocytosis complicated by secondary osteoporosis: successful therapy with bisphosphonates  
Lange U., Müller-Ladner U., Hermann W.; Bad Nauheim
- P 3.49 Quantitative Ultrasonometrie und biochemische Parameter des Knochenmetabolismus im Verlauf der normalen Schwangerschaft  
Hellmeyer L.; Marburg

**P 4 Poster - Varia**

- P 4.1 Verbesserung der Symptomatik der fibrösen Dysplasie durch Bisphosphonate - ein Fallbericht  
Pontz B., Gempel K.; München
- P 4.2 Ermüdungsbrüche der Füße als Symptom eines primären Hyperparathyreoidismus: Therapie durch Nebenschilddrüsenadenom-Entfernung gefolgt von Teriparatid-Behandlung  
Scharla St., Lempert U., Gärtner R.; Bad Reichenhall / München
- P 4.3 TRAP 5b bei aseptischen Lockerungen von Endoprothesen  
Kurth A. A., Strauch M., Eisenbeis K., Zichner L.; Frankfurt / Schwandorf / Schöneck
- P 4.4 Outcome of pelvic support osteotomy by Ilizarov method in treatment of unstable hip joint  
El-Mowafi H.; Mansoura (Ägypten)
- P 4.5 Behandlung der Arthrose des Hüftgelenks mit intraartikulärer Hyaluronsäure (GO-ON®)  
Förster K. K., Enderlein L., Koppelberg Th.; Wiehl / Pirna / Gummersbach
- P 4.6 Intraartikuläre Hyaluronsäure (GO-ON®/GO-ON® mini) in der Akut-Behandlung von Arthrosen kleiner Gelenke  
Förster K. K., von Zezschwitz W., Dittmar K.; Wiehl / Berlin