


# Sumatriptan- HEXAL®

Sehen Sie  
den Unterschied



Imigran®



Sumatriptan-HEXAL®

Lösung: Preis

www.hexal.de

- Das 1. Triptan von HEXAL
- Original-Qualität zum günstigen Preis!
- **25%\*** Preisvorteil zu Imigran®

Arzneimittel  
Ihres Vertrauens




\* z. B. Sumatriptan-HEXAL® 100 mg/6 Tabl. N1, im Vgl. zu Imigran® 100 mg/6 Tabl. N1, Lower-Taxe, Stand 03/2006

**Sumatriptan-HEXAL® 50 mg/- 100 mg Filmtabletten:** Wirkstoff: Sumatriptansuccinat. **Zusammensetzung:** 1 Filmtbl. enth. 70 mg/140 mg Sumatriptansuccinat entsp. 50 mg/100 mg Sumatriptan. **Sonstige Bestandteile:** mikrokrist. Cellulose, Croscarmellose-Na, Hypromellose, Lactose, Mg-Stearat (Ph. Eur.), Farbst. E 171. **Zusatzf. f. Sumatriptan-HEXAL® 50 mg:** Lactose-Monohydrat, Triacetin, Farbst. E 172. **Anwendungsgeb.:** Akute Behandl. v. Migräneanfällen m. u. ohne Aura. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe, Herzinfarkt in der Vorgeschichte od. ischäm. Herzkrankh., koronare Vasospasmen (Prinzmetal-Angina), periph. vasculäre Erkrankh., Sympt. od. Anzeichen einer ischäm. Herzkrankh., mittelschwerer bis schwerer Bluthochdruck, leichter unkontroll. Bluthochdruck, gleichzeit. Anwend. m. Ergotamin- od. Ergotaminderivat-halt. Arzneim. (einschließl. Methysergид) od. Monoaminoxidase (MAO)-Hemmern innerhalb v. 2 Wo. nach Abbruch einer Therap. m. MAO-Hemmern. Sollte nicht angew. werden b. Schlaganfall (CVA) od. vorübergeh. ischäm. Attacken (TIA) in der Krankh.-geschichte sowie b. schweren Leberfunkt.-stör. **Nebenwirk.:** Häufig: Kribbeln, Schwindel, Schläfrigkeit, vorübergeh. Bluthochdrucksteig. kurz nach der Anwend. Gesichtsrötung, Übelk., Erbrechen, Schweregefühl, Schmerzen (Hitze-/Druck- od. Erregtegefühl-Gefühl) v. Schwäche, Müdigk. **Sehr selt.:** geringfüg. Veränd. der Leberwerte, Überempf.-reakt. aller Schweregrade v. Hautausschlag bis zu selt. Fällen v. anaphylakt. Reakt., Krampfanfälle, Tremor, Dystonie, Nystagmus, Skotomen, Sensor. wie Augenflimmern, Doppeltsehen, Visusmind., Sehverlust, Bradykardie, Tachykardie, Herzklappen-Arhythmie, vorübergeh. ischäm. EKG-Veränd., koronare Vasospasmen, Herzinfarkt, Blutdruckabfall, Raynaud-Syndrom, ischäm. Kolitis, Steiß-, des Nackens, Entth. Lactose. Wert. Einzeih. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. verschreibungspflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/303538 **Stand:** Dezember 2005 HEXAL AG, 83607 Holzkirchen, <http://www.hexal.de>

SCHWERPUNKT

BORDERLINE



Borderline-Patienten sind Grenzgänger und für sich selbst und andere unberechenbar. Wir berichten über Entstehung, Prognose und Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) im Schwerpunkt

ab Seite **28**

## Diagnostik

BPS – Eine emotionale Achterbahnfahrt ..... 28

## Verhalten

Scham und Minderwertigkeit prägen das Selbstbild ..... 32

## Therapie

Mit psychodynamischen Verfahren erfolgreich behandeln ..... 34

## Aktuelle Studie

Was reduziert den Schmerz bei Borderlinern? ..... 39

## Borderline-Ambulanz


Die spezialisierten Anlaufstellen bilden ein Bindeglied zwischen ambulanter und stationärer Versorgung ..... 42

## Mutter-Kind-Behandlung

Kinder sollten in die Therapie eines psychisch erkrankten Elternteils einbezogen werden ..... 43

## ÄP-Service

Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Adressen ..... 44



Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich NeurologiePsychiatrie finden Sie unter [www.aerztlichepraxis.de](http://www.aerztlichepraxis.de)

Fotos: Bilderbox, Tilmann Titelbild: Arteria Photography