

THEMEN DER ZEIT

Psychische und Verhaltensstörungen
Die Epidemie des 21. Jahrhunderts? 834
 Prof. Dr. med. habil. Andreas Weber, Prof. Dr. mult. Georg Hörmann
 Priv.-Doz. Dr. med. Volker Köllner

109. Deutscher Ärztetag 2006
Gegen Stigmatisierung psychisch Kranker 841

Weibliche Genitalverstümmelung
Lebenslanges Leiden 842
 Prof. Dr. med. Heribert Kenterich, Dr. med. Isabell Utz-Billing

MEDIZIN / MEDICINE

Hypoxie im Flugzeug – flugphysiologische Betrachtungen 851
The physiology of flight hypoxia
 Dipl.-Sportl. Dr. med. Rainer Kowoll, Dr. med. Dipl.-Ing. Heiko Welsch
 Bianca Joscht, Prof. Dr. med. Dipl.-Geol. Hanns-Christian Gunga

3 Punkte CME Zertifizierte medizinische Fortbildung
Differenzialdiagnose des Oberbauchschmerzes 862
The diagnosis and management of upper abdominal pain
 Dr. med. Maro Niedergethmann, Prof. Dr. med. Stefan Post

Diskussion/Correspondence
Evidenzbasierte medikamentöse Therapie der Alzheimer-Erkrankung 856
Evidence based pharmacotherapy of Alzheimer's disease

Medizingeschichte(n) 855

Referiert 861

BEKANNTGABEN

Bundesärztekammer: Mitteilungen Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
„UAW-News – International“: Tödliches Leberversagen unter Pioglitazon 880

Kassenärztliche Bundesvereinigung: Mitteilungen/Bekanntmachungen
Ergänzende Vereinbarung zur Reform des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) – Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 91 Abs. 7 SGB V – Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für Praxiszertifizierungen nach dem QM-System QEP® – Aufhebung eines Vorbehaltes 880



Foto: Frommann/Balf

Auf dem Weg zu mehr Beweglichkeit: Ein Patient trainiert in der Klinik Bergmannstrost in Halle/Saale. Auf einem Symposium der Deutschen Rentenversicherung zur Wirksamkeit von Rehabilitationen wurde festgestellt, dass sich der Gesundheitszustand durch Reha verbessert und diese Wirkung für viele Betroffene mittel- und langfristig anhält. Seite 829

Hypoxie im Flugzeug

Wenn bei etwa 10 000 Metern Flughöhe ein Druckverlust im Flugzeug bemerkt wird, verbleiben zum aktiven Handeln in der Regel noch 30 bis 60 Sekunden. Danach ist keine willentliche Tätigkeit mehr möglich: Der Körper wird durch die Hypoxie in seiner Funktion eingeschränkt. Seite 851

Oberbauchschmerz

In diesem Artikel zur zertifizierten Fortbildung wird die Differenzialdiagnose des Oberbauchschmerzes behandelt. Informationen zu kardialen, pulmonalen und Stoffwechselerkrankungen können wichtige Hinweise liefern. Intensität, Lokalfund und Allgemeinsymptome tragen zur Therapieentscheidung bei. Seite 862

RUBRIKEN

Aktuell/Akut	816, 817
Medien	818
Briefe	846
Bücher	850
Feuilleton	872
Unternehmen	874
Auto	875
Lesereise	876
GOÄ-Fatgeber/Impressum	877
Personalien/Preise	878
Status	884
Schlusspunkt	letzte Seite
Berichtsbogen	3. Umschlagseite