


Kontrazeption

-  Kontrazeption bei SLE: Östrogene beeinflussen die Lupus-Aktivität nicht *N Engl J Med* 16

Menopause

- HRT mit Progesteron und transdermalem Östrogen *Symp.* 18
Welche Rolle spielt die Testosteron-Therapie? *Menopause* 18
Mütter von Oktober-Kindern kommen später in die Wechseljahre *Hum Reprod* 18




Neonatologie

- Zwillingskinder haben geringeren IQ *BMJ* 19
 Neonatale Enzephalopathie: Abkühlung verringert die Mortalität *N Engl J Med* 19
Frühgeborenen-Problematik: Psychosoziale Betreuungsstellen bieten Unterstützung *Symp.* 20
Anämische Frühgeborene: effiziente Kurzzeit-Therapie mit Erythropeitin *J Perinatol* 20
Basedow-Mutter – Thyreotoxikose beim Neugeborenen *Lancet* 20

Kongress

- Neue Strategien in der adjuvanten Brustkrebstherapie 22
steno steno steno steno 25

Onkologie

-  Zervixkarzinom: wie man auch Ärmere screenen und behandeln kann *JAMA* 23
Folsäure: Alkohol mindert Brustkrebsrisiko *BMJ* 23
 Endometriumkarzinom: wann eine adjuvante Strahlentherapie angezeigt ist *Oncologist* 24
 Digitale Mammographie: Wird die Brustkrebs-Diagnostik besser? *N Engl J Med* 25
Was tun bei HER2-positivem Mamma-CA? *Symp.* 26
Aromatasehemmer verlängert das krankheitsfreie Überleben *J Natl Cancer Inst* 26

Pränataldiagnostik

- Angeborene Herzfehler mit Echo früh erkennen *Am J Obstet Gynecol* 27
Detektionsrate einiger Missbildungen immer noch relativ niedrig *BJOG* 27
Harntrakt-Fehlbildungen: Wie aufwendig soll pränatal diagnostiziert werden? *J Urol* 27

Urologie

- Belastungsinkontinenz: gezielte Patientenansprache und Therapieführung steigern den Erfolg *Symp.* 28
Neue Therapie bei interstitieller Zystitis *Urology* 28
Impressum 26
MED-INFO 30
Bestellcoupon 30

Editorial

Wichtige Fragen, richtige Antworten

„Wenn Sie jetzt diese Veränderung an meinem Gebärmutterhals entfernen, muss ich dann mit Problemen rechnen, wenn ich ein Kind kriege?“

M. Kyrgiou et al. (*Lancet* 367, 2006, 489-498) sondierten anhand von 27 Studien die Folgen der Entfernung intraepithelialer Neoplasien bzw. frühinvasiver Läsionen mit den verschiedenen Methoden (am häufigsten wird LEEP, die elektrochirurgische Schlingenexzision, angewandt). Das Risiko für eine Frühgeburt war am stärksten bei der „kalten“ Konisation erhöht (RR = 2,59), weniger bei LEEP und bei der Laser-Konisation (RR = 1,70 bzw. 1,71); nicht signifikant wirkte sich die Laser-Ablation aus, aber dabei erhält man kein histologisch auswertbares Gewebe. Ein Zervix-Eingriff bleibt also nicht ganz ohne Folgen. Bei Frauen unter 25 mit geringgradigen Läsionen, die oft nicht weiter fortschreiten, sollte man auch die Option von weiterem Beobachten erwägen.

„Ich will ein Kind bekommen, aber ich nehme Antidepressiva. Angeblich schützt eine Schwangerschaft die Seele. Kann ich da diese Medikamente weglassen?“









L. S. Cohen et al. (*JAMA* 295, 2006, 499-507) überprüften mit Hilfe von 201 Patientinnen, ob es bei Frauen vermehrt zu Rezidiven einer Major Depression kommt, wenn sie die antidepressive Therapie zu Beginn einer Schwangerschaft absetzen. Tatsächlich erlitten von den absetzenden Frauen 68% einen Rückfall, von den weiter einnehmenden nur 26%. Man muss also zur Fortsetzung einer antidepressiven Medikation in der Schwangerschaft raten.

„Bei mir hat man mal eine Hepatitis B festgestellt. Kann man was tun, damit mein Baby nicht angesteckt wird?“

C. Lee et al. (*BMJ* 332, 2006, 328-331) schließen aus einer Analyse der Literatur, dass die Neugeborenen von Müttern mit positivem HBsAg seltener eine Hepatitis B bekommen, wenn sie HB-Immunglobulin oder eine HB-Vakzine oder beides kombiniert erhalten.

Dr. med. Wilfried Ehnert

Was bedeuten die Symbole?

- | | |
|---|---|
|  Anwendungsbeobachtung |  Metaanalyse |
|  Fall-Kontroll-Studie |  Randomisiert-kontrollierte Studie |
|  Fallbericht |  Sonstige Studienarten |
|  Kohortenstudie |  Übersicht |