


Neue Therapieoptionen mit Topotecan



INHALT

- Topotecan: wöchentliche Applikation oder Kombinationstherapie
- Überlebensvorteil unter Topotecan/Cisplatin beim metastasierten Zervixkarzinom
- Verbesserung der Therapiequalität

ZUM THEMA

Patientinnen mit rezidiviertem fortgeschrittenem Ovarialkarzinom bzw. rezidiviertem metastasiertem Zervixkarzinom profitieren von einer Therapie mit dem Topoisomerase-I-Inhibitor Topotecan. Dies dokumentieren die Ergebnisse kontrollierter klinischer Studien. Für die Rezidivtherapie des metastasierten Zervixkarzinoms wurde die Zulassung für die kombinierte Behandlung mit Topotecan und Cisplatin beantragt, da mit dieser Kombination erstmals ein signifikanter Überlebensvorteil im Vergleich zur Cisplatin-Monotherapie erreicht wurde. Für die Second-line-Therapie des fortgeschrittenen Ovarialkarzinoms werden die wöchentliche Applikation des Topoisomerase-I-Inhibitors sowie verschiedene Kombinationstherapien mit Topotecan untersucht, um die Behandlungsergebnisse weiter zu verbessern.

75.A
4323
-12.5.06-
ZB MED