

Tamsulosin HEXAL®

Gehen Sie neue Wege!



Preissenkung!*

Alfuzosin HEXAL® 10 mg

Wirkstoff: Alfuzosin-Hydrochlorid

Urologikum


Tamsulosin HEXAL® 0,4 mg retard

Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung



Wirkstoff: Tamsulosin-Hydrochlorid

Urologikum



20 Hartkapseln N1

www.urologie.hexal.de

NEU von HEXAL:

Alfuzosin HEXAL 10 mg

bis **47%** Preisvorteil zu
Uroxatral® uno*

Arzneimittel
Ihres Vertrauens




* Alfuzosin HEXAL 10 mg OP 100 vs. Uroxatral uno OP 100.
Lauer-Taxe, Stand: 01.06.2006

Alfuzosin HEXAL 10 mg Retardtableten: Wirkstoff: Alfuzosin-HCl. **Zusammensetzung:** 1 Retardtbl. enth. 10 mg Alfuzosin-HCl, Hyromellose, Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph. Eur.) [yllanzl], Povidon K25. **Anwendungsgeb.:** Behandl. der funktionellen Sympt. der benignen Prostatahyperplasie (BPH). **Gegenanz:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe gleichz. Einnahme v. and. Alpha1-Rezeptorenblockern Leberinsuff. Komb. m. Dopamin-Rezeptoragonisten. **Nebenwirk.:** Häufig Müdigkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Oberbauchbeschwerden, Asthmenie, Gelenks- / Schläfrigkeit, Schwindel, Unwohlsein, gestörtes Sehvermögen, orthostat. Hypotonie, Synkopen, Tachyk. / Palpit., Rhinitis, Durchfall, Erbrechen, Mundtrockenheit, Hautausschlag, Pruritus, Hämikontinenz, Hitzegefühl, Ödeme, Brustschmerzen. **Selt.** Verschlimm. od. Wiederauftreten einer Angina pectoris. **In Einzelz. / Präpismus:** Enth. Lactose Weid. Einzelnz. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. **Mat.-Nr.:** 3.303855. **Stand:** März 2006. HEXAL AG, 83607 Holzkirchen. <http://www.hexal.de>

Tamsulosin HEXAL 0,4 mg retard Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung: Wirkstoff: Tamsulosin-HCl. **Zusammensetzung:** 1 Hartkaps. m. veränd. Wirkstofffreisetzung enth. 0,4 mg Tamsulosin-HCl, mikrokristall. Cellulose, Gelatine, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Natriumdeoxydesulfat, Polysorbit 80, Talkum, Triethylcitrat, Druckkinte (Schellack Eisen III-oxid (E 172), (3-sn-Phosphatidylcholin (Soja), Antischaummittel DC 1510), Farbst. E 132, E 171, E 172. **Anwendungsgeb.:** Behandl. v. Sympt. des unteren Harntraktes b. der benignen Prostatahyperplasie (BPH). **Gegenanz:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe (einschließl. arzneimittelinduziertes Angioödem), anamnestisch bekannte orthostat. Hypotonie, schwere Leberinsuff. **Nebenwirk.:** Häufig Schwindel, Gelenks-, Kopfschmerzen, Tachykardie, orthostat. Hypotonie, Rhinitis, Obstipation, Diarrhö, Übelkeit, Erbrechen, Ausschlag, Juckreiz, Urtikaria, anormale Ejakulation, Asthmenie, Selt. Synkopen, Angioödem. **Selt.** Präpismus. **Weit. Einzelnz. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. Mat.-Nr.:** 3.303410. **Stand:** Januar 2006. HEXAL AG, 83607 Holzkirchen. <http://www.hexal.de>

SCHWERPUNKT



ONKOLOGIE

Kontrolliert abwarten oder definitiv behandeln? Fehlende Therapie-Nebenwirkungen erkaufen sich Prostatakrebs-Patienten unter Watchful Waiting mit der Angst vor einem Progress. Weitere Themen zur Uroonkologie

ab Seite **28**

Hoden

- Wann welche Nachsorgeuntersuchungen nötig sind.....28
- Schattenseiten der Chemotherapie.....29

Prostata

- Operation immer noch Standard.....32
- Permanent, temporär oder perkutan bestrahlen34
- Watchful Waiting bringt kaum Vorteile für die Lebensqualität.....35
- Screening: Männer mitentscheiden lassen!36

Niere

- Zytokine im Vergleich.....39
- Viel versprechende Substanzen im Test41
- Adjuvante Therapien gesucht44

Harnblase

- Tumormarker versus Urinzytologie45
- Follow-up der Nachsorge46


Nationale Krebskonferenz gefordert

Interview mit Prof. Bamberg von der Deutschen Krebsgesellschaft.....49

ÄP-Service

Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Adressen50

Bellage: Zertifizierte Fortbildung „Erektile Dysfunktion“



Täglich aktuelle
Meldungen unter

www.aerztlichepraxis.de

Fotos: AP-Archiv (2), Bilderbox, Westdeutsches Prostatazentrum, Laube, KES Titelbild: KES