

Leberzirrhose in Großbritannien

**Kann die „Epidemie“ gestoppt werden?**

Der Alkoholkonsum im Vereinigten Königreich hat sich zwischen den Jahren 1960 und 2002 verdoppelt, die Leberzirrhose-Raten und die Sterblichkeit sind erschreckend gestiegen, auch bei den Frauen.

Seit Anfang der 90er Jahre ist die Zirrhose-Mortalitätsrate steil angestiegen.

Gegenüber 1987 bis 1991 hat sich die Zirrhose-Sterblichkeitsrate 1997 bis 2001 bei Männern in Schottland mehr als verdoppelt; in England und Wales ist sie um mehr als zwei Drittel angestiegen. Bei Frauen nahm sie in diesem Zeitraum um fast die Hälfte zu.

In keinem anderen Land in Europa wurden so hohe Anstiege der Mortalitätsraten durch alkoholtoxisch bedingte

Leberzirrhosen verzeichnet. Vor allem in Ländern in Südeuropa sind die Zahlen gefallen. Die Zirrhose-Sterblichkeitsrate in Schottland gehört inzwischen zu den höchsten in Europa; im Jahr 2002 starben an dieser Folgeerkrankung 45 bzw. 20 von 100 000 Männern bzw. Frauen. (MO)

**S** Leon DA et al.: *Liver cirrhosis mortality rates in Britain from 1950 to 2002: an analysis of routine data. Lancet* 367 (2006) 52-56 – Room R: *British livers and British alcohol policy. Ebd.* 10-11

✖ Bestellnr. der Arbeit 060273

**Alkoholkonsum Mortalität**

Sex, Drogen und HIV in Moskau

**Die Frauen sind verwundbarer**

Die Russische Föderation ist bei den HIV-1-Infektionen in Osteuropa und Mittelasien Spitzenreiter. Die höchsten Ansteckungsraten finden sich in Großstädten wie Moskau, in denen Jugendliche mit i.v.-Drogenkonsum v. a. über Prostitution das Virus an heterosexuelle Nicht-Drogenabhängige weitergeben.

Zur Abschätzung der Prävalenzen in diesen Bevölkerungsgruppen wurden 604 Mädchen und Frauen sowie 402 Jungen und Männer in einer Jugendstrafanstalt, einem Untersuchungsgefängnis und einer

Obdachlosen-einrichtung für Erwachsene untersucht. Doppelt so viele Frauen wie Männer gaben an, im vorangegangenen Jahr Drogen injiziert zu haben. 79% der weiblichen Untersuchungshäftlinge waren Prostituierte.

Insgesamt litten die Frauen mindestens doppelt so häufig an den verschiedenen Geschlechtskrankheiten wie die Männer. Mindestens eine sexuell übertragbare bakterielle

Erkrankung hatten 58% der Mädchen in der Jugendstrafanstalt, 64% der Frauen in Untersuchungshaft und 75% der weiblichen Obdachlosen (bei ihnen Syphilis: 51%). HIV-seropositiv waren 4% der weiblichen Untersuchungshäftlinge, 3% der männlichen Jugendstraftäter und 2% der obdachlosen Frauen. Die Interaktion zwischen i.v.-Konsum und Prostitution dürfte einer der wesentlichen Gründe für die explosionsartige Zunahme an HIV-Infektionen in Moskau sein. (DS)

**S** Shakarishvili A et al.: *Sex work, drug use, HIV infection, and spread of sexually transmitted infections in Moscow, Russian Federation. Lancet* 366 (2005) 57-60

✖ Bestellnr. der Arbeit 052934

**Jugendstrafanstalt Obdachlosen-einrichtung**


Familiäre Konflikte begünstigen die ADHS *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 8

Epilepsie ist keine Kontraindikation für Stimulanzien 8

**Kongress**

8. Europäischer Kopfschmerzkongress 9

**Dementielle Syndrome**

 MRS-Befunde bei M. Alzheimer: Veränderungen vor der Symptommanifestation? *Neurology* 10

DAT: Mangelnde Gefäßreagibilität als Prädiktor? *Stroke* 10

**Epilepsie**

Homocystein: Gängige Antiepileptika erhöhen die Spiegel *Seizure* 12

Fokale Epilepsien: Positive Jahresbilanz für Zonisamid 12

Kinder mit Epilepsie: Tagesmüdigkeit durch gestörten Schlaf *Epilepsy Behav* 13

Neue DGN-Leitlinie Europa: Topiramamat ist eine First-line-Option bei Ersteinstellung 13

EURAP-Schwangerschaftsregister: Die Mehrheit der Frauen bleibt anfallsfrei *Neurology* 13


**IM FOKUS Ausgewählte Studien für ausgewählte Leser 14**

**Multiple Sklerose**

MS-Sterblichkeit in den USA gestiegen *Neuroepidemiol* 14

Empfehlungen zur Antikörper-Bestimmung *Eur J Neurol* 14


Neuropsychologische Defizite bei Schäden grauer und weißer Substanz *Neurology* 16

 „Record Linkage“-Studie: Erhöhtes MS-Risiko nach Kopfverletzungen? *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 16

Gekreuzte Aphasie bei MS-Patientin *Mult Scler* 16

**Neuropathie**

CTS und Ulnarisneuropathie des Ellenbogens: Der BMI beeinflusst die Risiken *Muscle Nerve* 17

 Klinisches Spektrum der Neuropathien bei Kryoglobulinämie 17

@ SITE-SEEING GESUNDHEITSÖKONOMIE 17

**Parkinson-Syndrome**

Kreatin und Minocyclin: „Die weitere Prüfung ist nicht aussichtslos“ *Neurology* 18


Dopaminagonist bessert auch die Depression 18

Ethylester-Levodopa: Vorteile bei fluktuierenden Patienten? *Arch Neurol* 20

Hoher Stellenwert für die COMT-Hemmung 20

Parkinson-Frühermarker bei RBD häufiger *Neurology* 20

**Restless Legs Syndrom**

 An Insomnie-Patienten untersucht: RLS-Risiko durch Antidepressiva? *Sleep Med* 21