




SCHWERPUNKT

ENDOKRINOLOGIE



Zu fettige, unausgewogene Ernährung ist einer der Gründe, warum der Typ-2-Diabetes bereits bei Kindern Einzug gehalten hat. Wie dieser Entwicklung Einhalt geboten werden könnte, beschreibt der Kinderdiabetologe Dr. Thomas Kapellen.

ab Seite **32**

Pubertas tarda bei Mädchen

Schon 17 und noch ein Kind32

Latente Hypothyreose

Therapie bleibt Ermessensfrage37

Diabetes mellitus

Insulinpumpen reduzieren die Hypoglykämie-Gefahr38

Keine Seltenheit mehr: Teenager mit Typ-2-Diabetes40

Diabetes-Nannies helfen, wenn das Insulin zum Zankapfel wird42

Adipositas

Häppchenweise Reha statt langem Klinikaufenthalt43


Fragebogen zur Zertifizierten Fortbildung

Sammeln Sie bis zu 2 CME-Punkte44

Formoterol HEXAL®

Easyhaler®

Pulver zur Inhalation



**NEU von
HEXAL**

www.asthma.hexal.de

Langwirksames β_2 -Mimetikum


Einfache Handhabung:
Schütteln – Klicken – Inhalieren

Ohne kompliziertes Nachfüllen

Arzneimittel
Ihres Vertrauens



Formoterol HEXAL® Easyhaler® 12 Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation;
Wirkstoff: Formoterolfumarat-Dihydrat. **Zusammensetzung:** Eine abgegeb. Dos. enth. 12 µg Formoterolfumarat-Dihydrat. **Sonst. Bestandt.** Lactose-Monohydrat (Ph.Eur.). **Anwendungsgeb.:** Zur Behandl. v. Asthma b. Pat., die m. inhalat. Kortikosteroiden behandelt werden u. die nach aktuell. Behandl.-richtlinien auch einen langwirks. Beta-Agonisten benötigen. **Gegenanz.**: Überempf. geg. Inhaltsstoffe. **Nebenwirk.:** Häufig: Kopfschmerzen, Palpitationen, Tremor. **Gelegentl.:** Agitiert, Schwindel, Angst, Nervosität, Schlafstör., Tachykardie, Muskelkrämpfe, Myalgie. **Selt.:** Hypokaliämie, Vorhofflimmern, supraventrikul. Tachykardie, Extrasystolen, Verschlimm. eines Bronchospasmus, paradoxer Bronchospasmus, oropharyngeale Reizung. **Sehr selt.:** einschließl. **Einzel.** Hyperglykämie, Angina pectoris, Verlang. des QT-Intervalls, Veränd. des Blutdrucks, Geschmacksstör., Übelk., Überempf.-reakt. Eine Behandl. m. Beta-Agonisten kann die Konzentrat. v. Insulin freien Fettsäuren, Glycerol u. Ketonkörpern im Blut erhöhen. Lactose-Monohydrat enth. geringe Mengen Milchprotein u. kann deshalb allerg. Reakt. hervorrufen. Enth. Lactose-Monohydrat (Ph.Eur.). **Weit Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo.** Verschreibungspflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/302858 **Stand:** August 2005 HEXAL AG, 83807 Holzkirchen. <http://www.hexal.de>



Täglich aktuelle
Meldungen unter

www.aerztlichepraxis.de

Fotos: Bilderbox, Superbild, ROCOM, Fotex Titelbild: Fotex