Zertifizierte Fortbildung CME 2 Punkte

SCHWERPUNKT

PSYCHISCHE & NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN



Depressionen bei Kindern und Jugendlichen werden häufig übersehen oder zu spät erkannt. Dass sie oft im Zusammenhang mit anderen psychischen oder neurologischen Erkrankungen wie ADHS oder dem Tourette-Syndrom auftreten, erschwert die Diagnose weiter. Mehr dazu

ab Seite 20

Tourette-Syndrom

„Schluckauf" im Gehirn 20

ADHS

... kommt selten allein 22

Wie viel Diagnostik ist nötig? 24

„Eltern müssen sich als Gestalter der Therapie begreifen" 26

Migräne

Wenn Kinder lieber schlafen statt zu spielen 28

Depression

„Viele leiden im Stillen" 30

Suizidprävention

Die Warnsignale beachten 32

Tiertherapie

Auf den Hund gekommen 34

CME-Fragebogen 35

ÄP-Service

Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Adressen 36



Täglich aktuelle Meldungen unter

www.aerztlichepraxis.de

Fotos: Kinderchirurgie Jena, stock.xchng (2), Archiv/Rose Titelbild: stock.xchng

Formoterol HEXAL®

Easyhaler®

Pulver zur Inhalation

NEU von HEXAL

www.asthma.hexal.de

Langwirksames β_2-Mimetikum

Einfache Handhabung:
Schütteln – Klicken – Inhalieren

Ohne kompliziertes Nachfüllen

Arzneimittel Ihres Vertrauens

HEXAL

Formoterol HEXAL® Easyhaler® 12 Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation: Wirkstoff: Formoterolfumarat-Dihydrat. **Zusammensetz.:** Eine abgegeb. Dos. enth. 12 µg Formoterolfumarat-Dihydrat. *Sonst. Bestandt.:* Lactose-Monohydrat (Ph.Eur.). **Anwendungsgeb.:** Zur Behandl. v. Asthma b. Pat., die m. inhalat. Kortikosteroiden behandelt werden u. die nach aktuell. Behandl.-richtlinien auch einen langwirks. Beta$_2$-Agonisten benötigen. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe. **Nebenwirk.:** *Häufig:* Kopfschmerzen, Palpitationen, Tremor. *Gelegentl.:* Agitiertheit, Schwindel, Angst, Nervosität, Schlafstör., Tachykardie, Muskelkrämpfe, Myalgie. *Selt.:* Hypokaliämie, Vorhofflimmern, supraventrikul. Tachykardie, Extrasystolen, Verschlimm. eines Bronchospasmus, paradoxer Bronchospasmus, oropharyngeale Reizung. *Sehr selt., einschließl. Einzelf.:* Hyperglykämie, Angina pectoris, Verland. des QT-Intervalls, Verand. des Blutdrucks, Geschmacksstör., Ubelk., Überempf.-reakt. Eine Behandl. m. Beta$_2$-Agonisten kann die Konzentrat. v. Insulin, freien Fettsäuren, Glycerol u. Ketonkörpern im Blut erhöhen. Lactose-Monohydrat enth. geringe Mengen Milchprotein u. kann deshalb allerg. Reakt. hervorrufen. Enth. Lactose-Monohydrat (Ph.Eur.). Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/302858 **Stand:** August 2005. HEXAL AG, 83607 Holzkirchen, http://www.hexal.de