

Multivitamine und mehr Folsäure

Seit Jahrzehnten ist die Bedeutung der Folsäure für die Entwicklung gesunder Kinder während der Schwangerschaft bekannt. In den letzten Jahren wurde nachgewiesen, dass ein signifikant besserer Schutz vor kindlichen Fehlbildungen gegeben ist, wenn perikonzeptionell nicht nur Folsäure allein, sondern eine Vitamin-kombination plus Folsäure eingenommen wird. **Seite 621**

Multivitaminen et apport plus élevé d'acide folique

L'importance de l'acide folique dans le développement d'enfants en bonne santé pendant la grossesse est connue depuis des décennies. Ces dernières années, il a été prouvé qu'un apport périconceptionnel de multivitaminen et d'acide folique offrait une protection plus efficace contre les malformations de l'enfant qu'avec l'acide folique seul. **page 626**

SAZ-Interview mit Prof. Klaus Pietrzik

Die bis jetzt propagierten 0.4 mg Folsäure genügen nach neuesten Erkenntnissen als Gegenspieler von Homocystein nicht. Wenn ein Kinderwunsch besteht, sollte sofort mit der Folsäureeinnahme begonnen werden, und zwar sicherheitshalber mit der höheren Dosierung von 0.8 mg, am besten in Kombination mit Multivitaminen. **Seite 624**

Magistrale Permethrin-Rezeptur

Die Wize schlägt nach Recherchen eine einfache magistrale Permethrin-Rezeptur vor. Denn lang vernachlässigte Therapien werden wieder aktuell, nachdem unangenehme Biester auch in den Industrieländern wieder auf Vormarsch sind. Doris Ballinari orientiert. **Seite 629**



Préparation magistrale simple de perméthrine

Après quelques recherches, la Wize suggère une préparation magistrale simple de perméthrine. Des traitements longtemps négligés redeviennent en effet d'actualité maintenant que de sales petites bêtes refont leur apparition dans les pays industrialisés. Doris Ballinari fournit de plus amples informations. **page 633**

page 633



Akute Rausche dominieren

Der sporadisch-exzessive Alkoholkonsum von Jugendlichen bereitet auch internationalen Organisationen und Behörden Sorgen. Die Verbreitung und Häufigkeit von Trinkgewohnheiten unter jungen Menschen müssen wesentlich reduziert werden. Werden die Befunde in den verschiedenen Ländern miteinander verglichen, schneidet die Schweiz schlecht ab. **Seite 639**

Prédominance de l'ivresse alcoolique aiguë

La consommation excessive sporadique d'alcool chez les adolescents inquiète aussi les organisations internationales et les autorités. La diffusion et la fréquence d'habitudes de boire chez les jeunes doit être réduite de façon considérable. En comparaison avec d'autres pays, la Suisse présente de mauvais résultats. **page 642**

page 642

MITTEILUNGEN COMMUNICATIONS


Agenda 2006	650
Manifestations FPH reconnues pour l'officine et l'hôpital	650
FPH-anerkannte Veranstaltungen im Bereich Offizin- und Spitalpharmazie	651
Expopharm 2006 à Munich	652
Pharmactuel	652
Ärzte-Initiative Zürich	652
Gesundheitsschäden durch Asbest	652
APV: Veranstaltungskalender	652
Erneuter Versorgungseingpass für Isoniazid	652

PHARMA+PARTNERS

653

STELLENANZEIGER OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

Impressum 3. UG



Terbinafin-Mepha®

Weiterführende Informationen siehe Arzneimittelkompendium