

Cancer Care

Nachrichten aus der Onkologie

INHALT

- 4 Fortgeschrittene gastro-intestinale Stromatumoren
Nahezu fünf Jahre medianes Überleben
- 6 Skelettkomplikationen beim Prostatakarzinom
Zoledronat bringt deutlichen Nutzen



IRIS-Update zur CML-Primärtherapie mit Imatinib

5-Jahres-Daten bestätigen dauerhaften Benefit

Auch die aktuelle Auswertung der IRIS-Studie untermauert die herausragende Wirksamkeit der Primärtherapie mit Imatinib. Nach fünf Jahren sind nahezu 90% der Patienten am Leben. Die jährlichen Progressionsraten unter Imatinib nahmen im Verlauf weiter ab und lagen im fünften Behandlungsjahr nur noch bei 0,6%. Damit wurde Imatinib eindrucksvoll als Goldstandard in der Primärtherapie der CML bestätigt.

Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie (CML), die primär mit dem Tyrosinkinasehemmer Imatinib behandelt werden, haben eine sehr günstige Prognose. Dass die hohe Überlebensrate auch über eine

lange Zeit aufrechterhalten werden kann, haben bereits im vergangenen Jahr die 54-Monats-Ergebnisse aus der IRIS-Studie (s. Cancer-Care-Ausgabe 30, März 2006) gezeigt. Die nun auf dem ASCO-Kongress in Atlanta

- 9 Endokrine Adjuvanz des Mammakarzinoms
ASCO 2006: Letrozol ist Tamoxifen überlegen
- 12 Einer Eisenüberladung wirksam vorbeugen
Deferasirox – nur einmal täglich oral

URBAN & VOGEL
MEDIKAL- UND MEDIZIN-VERLAGSGESELLSCHAFT

UeT
Zs. 40
-Beil. zu 1829
ZB MED