

Tamsulosin HEXAL®

Gehen Sie neue Wege!



Alfuzosin HEXAL® 10 mg
Retardtabletten

Urologikum

Tamsulosin HEXAL® 0,4 mg retard
Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Urologikum



www.urologie.hexal.de

NEU von HEXAL:

Alfuzosin HEXAL® 10 mg

bis **49%** Preisvorteil zu
Uroxatral® uno*

Arzneimittel
Ihres Vertrauens



* Alfuzosin HEXAL 10 mg OP 100 vs. Uroxatral uno OP 100.
Lauer-Taxe, Stand: 15.08.2006

Alfuzosin HEXAL 10 mg Retardtabletten: Wirkstoff: Alfuzosin-HCl. **Zusammensetzung:** 1 Retardtbl. enth. 10 mg Alfuzosin-HCl, Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Povidon K25. **Anwendungsgeb.:** Behandl. der funktionellen Sympt. der benignen Prostatatypertrophie (BPH). **Gegenanz:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe, gleichz. Einnahme v. and. Alpha-1-Rezeptorenblockern, Lebenssuff., Komb. m. Dopamin-Rezeptoragonisten. **Nebenwirk.:** Häufig: Müdigkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Übelk., Oberbauchbeschwerden, Asthenie. **Gelegentl.:** Schläfrigkeit, Schwindel, Unwohlsein, gestörtes Sehvermögen, orthostat. Hypotonie, Synkopen, Tachyk., Palpitat., Rhinitis, Durchfall, Erbrechen, Mundtrockenh., Hautausschlag, Pruritus, Harninkontinenz, Hitzewall., Ödeme, Brustschmerzen. **Sehr selten:** Verschlimmer. od. Wiederauftreten einer Angina pectoris. **In Einzellf.:** Priapismus, Entth., Lactose-Weit., Einzellf. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. **Verschreibungspflichtig. Mat.-Nr.:** 3/303895 **Stand:** März 2006 HEXAL AG, 83607 Holzkirchen, http://www.hexal.de

Tamsulosin HEXAL 0,4 mg retard Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung: Wirkstoff: Tamsulosin-HCl. **Zusammensetzung:** 1 Hartkaps. m. veränd. Wirkstofffreisetz., enth. 0,4 mg Tamsulosin-HCl, mikrokristall. Cellulose, Gelatine, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Natriumhydrogencarbonat, Polysorbat 80, Talkum, Triethylcitrat, Drucktinte (Schellack, Eisen(III)-oxid (E 172), (3-Sn-Phosphatidylcholin (Soja), Antischaummittel DC 1510), Farbst. E 132, E 171, E 172. **Anwendungsgeb.:** Behandl. u. Sympt. des unteren Harntraktes b. der benignen Prostatatypertrophie (BPH). **Gegenanz:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe (einschließl. arzneimittelinduziertes Angioödem), anamnesticht bekannte orthostat. Hypotonie, schwere Lebenssuff. **Nebenwirk.:** Häufig: Schwindel. **Gelegentl.:** Kopfschmerzen, Tachykardie, orthostat. Hypotonie, Rhinitis, Obstipation, Diarrhö, Übelk., Erbrechen, Ausschlag, Juckreiz, Urinkära, anormale Ejakulation, Asthenie. **Selten:** Synkope, Angioödem. **Sehr selten:** Priapismus. **Weit. Einzellf. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. Mat.-Nr.:** 3/303410/1 **Stand:** Januar 2006 HEXAL AG, 83607 Holzkirchen, http://www.hexal.de

SCHWERPUNKT

MIKTIONSSTÖRUNGEN



Schwangerschaft und Geburtstraumen machen die Belastungsinkontinenz zu einer Frauenkrankheit. Prophylaxe und Therapiemöglichkeiten sind Themen im Schwerpunkt dieser Ausgabe

ab Seite **30**

Belastungsinkontinenz

- Prävalenz und Pathophysiologie einer Frauenkrankheit30
- Operations-Methoden im Vergleich31
- Schwangerschaft und Geburt: Belastungsprobe für den Beckenboden.....36

Hyperaktive Blase

- Sakralnervenblockade und Botulinumtoxin schließen Lücke zwischen Medikamenten und Op.34

Forschung

- Miktionskontrolle im Gehirn sichtbar gemacht.....39

Paruresis

- Wer unter Paruresis leidet, kann nicht auf öffentlichen Toiletten urinieren. Die psychische Störung kann zu Nierenschäden führen40


Medizingeschichte

- Vom Bronzeröhrchen zum Ballonkatheter.....42

ÄP-Service

- Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Adressen43

Beilage: Zertifizierte Fortbildung „Nephrolithiasis“



Täglich aktuelle
Meldungen unter

www.aerztlichepraxis.de

Fotos: Archiv, Bilderbox, KES/Füepfl, Titelbild: ddp