

Historie

- 525 S. Papasimos
Hippokrates – ein Orthopäde und Traumatologe

Schwerpunkt

- 529 A. Woltmann, V. Bühren
Instabiler hinterer Beckenring: offene Reposition und Osteosynthese bei grober Dislokation
- 536 M. Schofer, H.-R. Kortmann
Arthroskopisch assistierte minimalinvasive Osteosynthese der Tibiakopffraktur
- 543 R. Gaulke, C. Krettek
Die intramedulläre Kirschnerdrahtosteosynthese distaler Mittelhandknochenfrakturen

Varia

- 547 R. Gaulke, C. Krettek
Die minimalinvasive offene Spaltung des Retinaculum flexorum zur Behandlung des Karpaltunnelsyndroms
- 551 W. Hönle, A. Schuh
Ungewöhnlicher intraoperativer Befund bei der Revision eines Tarsaltunnelsyndromes

Titelabbildung: Modell der iliolumbalen Transfixation von
a) hinten mit den Feinrepositionsmöglichkeiten vertikal und horizontal,
b) von der Seite mit der Schraubenrichtung (gestrichelte Linie) und
c) von vorne mit Demonstration der durchgebohrten Gegenkortikalis im Ilium
und der Schraubenrichtung (gestrichelte Linie).

