

akuten Koronarsyndrom. .... 16

### Schwangerschaft ist doch keine Krankheit

Hausarzt Dr. Drews zu skurilen Krankschreibungswünschen. 30

### Bandscheibe im Wirbel

Wenn der Schmorl-Knoten schmerzt. .... 31

## Politik und Perspektiven

### Wie stark wird die PKV beschädigt?

Die Pläne der Koalition. .... 25

### Interdisziplinäre Familienpraxis

Neue Versorgungsideen aus der Provinz. .... 28

## Praxisführung und Geld

### Helferin abgelehnt – Schadenersatz?

Die Folgen des Antidiskriminierungsgesetzes. .... 35

### Deutsche Hausärzte in England gesucht

Für Wochenenddienst oder länger. .... 39

Impressum ..... 30

Mit dem Passwort doc finden Sie in [www.medical-tribune.de](http://www.medical-tribune.de) spezielle Informationen für Ärzte.



- Dualer Wirkansatz<sup>2</sup>
- Effektiver Frakturschutz an Wirbelsäule und Hüfte<sup>3,4,5</sup>

**PROTELOS® 2g**

28 Beutel

**PROTELOS® 2g**

28 Beutel

1 Beutel täglich

- 1) DVO Leitlinie 2006, [www.luther.de/med/le/leitlinie/](http://www.luther.de/med/le/leitlinie/)
- 2) Marie PJ et al., Calcif Tissue Int. 2001; 69:171-179
- 3) Meunier PJ et al., N Engl J Med 2004; 351:159-166
- 4) Reginster JY et al., JCEM 2005; 90(5):2810-2822
- 5) Reginster JY et al., Osteoporos Int. 2006; ECLFO OC 31(Abstrakt)
- 6) Meunier PJ et al., 2006, I CCEO OC58 (Abstrakt)

**ProteLos® 2 g** – Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen. Wirkstoff: Ranelic-säure, Distroniumsals (Strontiumranelat). **Zusammensetzung:** Jeder Beutel enthält 2 g Ranelic-säure, Distroniumsals. Sonstige Bestandteile: Aspartam (E951), Maltodextrin, Mannitol (Ph. Eur., E421). **Anwendungsgebiete:** PROTELOS ist ein nicht-hormonelles Arzneimittel zur Behandlung von Osteoporose bei postmenopausalen Frauen. PROTELOS reduziert das Frakturrisiko an Wirbelsäule und Hüfte. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Strontiumranelat oder einen der sonstigen Bestandteile von PROTELOS. **Nebenwirkungen:** Während klinischer Studien waren der Übelkeit, Durchfall, Kopfschmerzen und Hautreizungen die häufigsten Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen waren jedoch leicht und vorübergehend und veranlassten die Patientinnen in der Regel nicht, die Behandlung zu beenden. Andere seltener berichtete Ergebnisse waren: Blutgerinnsel, Bewusstseinsstörungen, Gedächtnisschwund und in seltenen Fällen Krampfanfälle. Weitere Hinweise siehe Fachinformation. **Verschreibungspflichtig.**

Stand: September 2004  
Pharmazeutischer Unternehmen: Les Laboratoires Servier  
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankreich.  
Örtlicher Vertreter: Servier Deutschland GmbH  
Westendstraße 170, D-80686 München, Tel: +49 89 57095 01



# Arztwechsel gegen Patientenwillen Not zwingt Kollegen zu faulen Mitteln

Zu Dr. Drews' Kolumne „Arztwechsel gegen den Willen des Patienten – Haben junge Kollegen kein Rückgrat mehr?“, MT 39/06, S. 28

An MEDICAL TRIBUNE  
Diese Fälle sind mir in 35 Jahren Berufsausübung häufig passiert. In den letzten fünf Jahren vermehrt. Das ist kein Frage des sog. ärztlichen Selbstbewusstseins, sondern

vielmehr eine Frage der Not. Wo Politik und Kassenärztliche Vereinigungen Hand in Hand arbeiten und den Stundenlohn eines Arztes auf das Niveau eines Hilfsarbeiters senken, wird zu solchen Mitteln gegriffen und, glauben Sie mir, es kommt noch schlimmer!

Dr. Hugo Domdey  
Facharzt für Innere Medizin  
Meerbusch

te Akademi  
der allerme  
etriebswirt  
also weit  
der Indust  
Dienstes.  
Wenn e  
trotzdem

Kind  
Ers  
dar

Zu Dr. Dr  
greift im  
werden  
dern!",

An M  
Herr  
Sicht des  
mehr ge  
diese Ge  
Die Pat  
Struktur  
seien sc  
gesichts  
kenntni  
heißt d  
noch „  
se hinz  
meister  
toren -  
übersic  
schärf  
wirrw  
Abschi  
auch i  
Chr  
ten Bu  
Releva  
sehr a  
danac  
manch  
Hohn