

Spektrum der Augenheilkunde

Zeitschrift der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft

Inhalt

Band 20 Heft 4 2006

ISSN 0930-4282 SPAUET 20 (4) 179-207 (2006)

Editorial

Binder S.

179

Originalarbeiten

Evaluierung eines neuen Mobilitätstests und Sehschärfentests zur Erfassung des funktionellen Sehens	Ivatinovic D., Koch M., Langmann A., Hornig R., Velikay-Parel M.	180
Botulinumtoxin in der Strabologie	Langmann A., Koch M., Horwath-Winter J.	185
Abnahme der Mitochondrienaktivität menschlicher Bindehautzellen nach Säure- und Laugenverätzung	Schmut O., Trummer G., Horwath-Winter J., Faschinger C.	188
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit: Erfahrungen der Augenabteilung des Hanuschkrankenhauses der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK)	Rigal K., Harrer S., Burgmüller W., König U., Rainer C., Höftberger R.	191

Kasuistik

Wegener-Granulomatose: ein diagnostisches Problem	Pahor D., Gračner B., Gračner T., Pahor A.	196
---	--	-----

Praxis

Ein neues Straylightmeter im klinischen Test	Nischler C., Dopsch U., Emesz M., Nitsch S., van Rijn L. J., van den Berg T. J. T. P., Wilhelm H., Grabner G.	200
--	---	-----

Gesellschaftsbericht 204 · Buchbesprechung 205 · Fortbildungsveranstaltungen 205 · Kongresskalender 206 · Impressum 207

Umschlagbilder: Wegener-Granulomatose: Mit freundlicher Genehmigung von Dusica Pahor.
Oben: Linkes Auge: Anzeichen von vorderer Episkleritis und Skleritis mit anliegender Bindehautstauung, peripherer Hornhautverdünnung mit überlagerndem Epitheldefekt und mäßiger Anwesenheit von Zellen in der Vorderkammer.
Unten: Linkes Auge: Fundusuntersuchung – temporal inferior exudative Netzhautablösung mit „macula pucker“. Der Ultraschall zeigte eine Skleradicke von 4,4 mm mit seröser Ader- und Netzhautablösung.