

Neue Arzneimittel

Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Dr. Ernst Mutschler | Frankfurt/Main

Redaktion: Dr. Bettina Hellwig (verantwortlich)


ISSN 0724 - 567X | Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart

53. Jahrgang | November 2006 | 11

102 REZEPTOR-TYROSIN-KINASEN-HEMMSTOFF

Sunitinib


Sunitinib (Sutent®) wird zur Behandlung nicht resezierbarer und/oder metastatisch maligner gastrointestinaler Stromatumoren (GIST) eingesetzt, wenn eine Behandlung mit Imatinibmesylat wegen Resistenz oder Unverträglichkeit fehlgeschlagen ist. Sunitinib wird ferner zur Behandlung fortgeschrittener und/oder metastasierter Nierenzellkarzinome (MRCC) eingesetzt, wenn eine Interferon-alpha- oder Interleukin-2-Therapie nicht erfolgreich war.



107 EISENCHELATOR

Deferasirox

Deferasirox (Exjade®) ist angezeigt zur Behandlung der chronischen Eisenüberladung durch häufige Transfusionen (> 7 ml/kg und Monat Erythrozytenkonzentrat) bei Patienten mit Beta-Thalassämia major im Alter von 6 Jahren und älter. Exjade® ist in drei Tablettenstärken erhältlich (125, 250 und 500 mg). Die Ziele der Eisenchelatherapie bestehen in der Entfernung der Eisenmenge, die transfundiert wird, und, wenn erforderlich, in der Reduktion der vorhandenen Eisenüberladung.



Z. A.
1854
- Beil. -
ZB MED