

MEDICAL BUNDE

Von Ärzten für Ärzte

| | | |
|----|---|--|
| 41 | Fieber messen – wo gelingt's am besten? Mund, Axilla, After oder Ohr, ein Experte zeigt Vor- und Nachteile der Messorte. 15 | Entwarnung bei Diagnosefehlern Hausarzt übersieht Appendix-Perforation: Irrtum allein rechtfertigt kein Schmerzensgeld. 33 |
|----|---|--|

Anzeige



Tetra-Gelomyrtol®
einfach doppelt wirksam

Experten: Lebensstil ändern reicht nicht Beim Typ-2-Diabetes sofort Medikamente!

Erst einmal den Lebensstil ändern, hieß bisher die Devise beim frisch entdeckten Typ-2-Diabetiker. Doch wer nach der Diagnose zunächst nur auf Abspecken und mehr Freizeitsport setzt, lässt wertvolle Zeit verstreichen, kritisieren internationale Diabetes-Experten. In ihrer aktuellen Erklärung fordern sie deshalb, dass in

der Typ-2-Diabetiker schon bei Diagnose zusätzlich sofort medikamentös behandelt wird, am besten mit Metformin – sofern bei ihm dafür keine Kontraindikationen bestehen. Außerdem sollten die weiteren therapeutischen Optionen einschließlich Insulin im Verlauf der Erkrankung rascher genutzt werden. Wie die me-

derne Therapie des Typ-2-Diabetes nach Expertenmeinung aussieht, erfahren Sie in unserem Special „Metabolisches Syndrom“. Wir haben für Sie ein rundes Informationspaket zur erfolgreichen Therapie von Adipositas, Diabetes, Hochdruck und Fettstoffwechselstörungen zusammengestellt. 17-28

Freitod als Geschenk?

„So zu sterben, ist ein Geschenk“, meint „Exit“-Vorstandsmitglied Walter Fesenbeckh im Interview. Warum der deutsche Theologe schwerstkranken Menschen in der Schweiz beim Freitod hilft, 30 auf Seite:



Walter Fesenbeckh