



SCHWERPUNKT

DER ÄLTERE PATIENT

Alte Menschen sind potenzielle Urologie-Patienten. Mit den Beschwerden dieser Klientel beschäftigt sich der Schwerpunkt dieser Ausgabe

ab Seite **30**

**Geriatrie**

- Alte Menschen als Chance begreifen..... 30
- Arzneimittel-Interaktionen beachten - ein Fallbeispiel ..... 31

**Prostatakarzinom**

- Neue Biomarker gesucht - Einblick in die aktuelle Genomforschung..... 32

**Benigne Prostatahyperplasie**

- Greenlight-Laser kann sich mit TURP messen..... 33
- Unter Antikoagulation ist Laservaporisation Therapie der Wahl ..... 34

**Krebsfrüherkennung**

- Pro und Kontra PSA-Screening ..... 36

**Erektile Dysfunktion nach Prostatektomie**

- Schlechte Chancen ohne Nerverhalt ..... 40

**IGeL**

- Alternden Männern mit Testosteron auf die Sprünge helfen ..... 42

Urologie		Ar
<p><b>Arztpraxis abzugeben?</b></p> <p>... (text) ...</p>	<p><b>Hier SP die MUs</b></p> <p>... (text) ...</p>	<p><b>PHAS</b></p> <p>... (text) ...</p>
<p>... (text) ...</p>	<p>... (text) ...</p>	<p>... (text) ...</p>

Täglich aktuelle Meldungen unter [www.aerztlichepraxis.de](http://www.aerztlichepraxis.de)

# Ihre Wahl bei BPH!



**Alfuzosin HEXAL® 10 mg**  
Retardtabletten

Wirkstoff: Alfuzosin-HCl, Hydrochlorid  
Urologikum

**Tamsulosin HEXAL® 0,4 mg retard**  
Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Wirkstoff: Tamsulosin-Hydrochlorid



[www.urologie.hexal.de](http://www.urologie.hexal.de)

**NEU von HEXAL:**  
**Alfuzosin HEXAL® 10 mg**

● bis **51%** Preisvorteil zu Uroxatral® uno\*

Arzneimittel Ihres Vertrauens



\* Alfuzosin HEXAL 10 mg OP 100 vs. Uroxatral® uno OP 100. Lauer-Taxe. Stand: 15.10.2006

**Alfuzosin HEXAL 10 mg Retardtabletten:** Wirkstoff: Alfuzosin-HCl. Zusammensetzung: 1 Retardtbl. enth. 10 mg Alfuzosin-HCl, Hydrochlorid, Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph.Eur.), [Laktanz], Povidon K25. **Anwendungsgeb.:** Behandl. der funktionellen Sympt. der benignen Prostatahyperplasie (BPH). **Gegenanz:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe, gleichz. Einnahme v. and. Alpha<sub>1</sub>-Rezeptorenblockern, Leberinsuff., Komä. m. Dopamin-Rezeptoragonisten. **Nebenwirk.:** Häufig: Müdigkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Oberbauchbeschwerden. **Geliegend:** Schläfrigkeit, Schwindel, Unwohlsein, gestörtes Sehvermögen, orthostat. Hypotonie, Synkopen, Tachyk., Palpitat., Rhinitis, Durchfall, Erbrechen, Mundtrockenheit, Hautausschlag, Pruritus, Hämikontinenz, Hitzegefühl, Ödeme, Brustschmerzen. **Selten:** Verstopfung, Hautausschlag, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Schläfrigkeit, Tachykardie, orthostat. Hypotonie, Rhinitis, Obstipation, Diarrhö, Übelkeit, Erbrechen, Ausschlag, Juckreiz, Urinkaria, anormale Ejakulation, Asthenie. **Selten:** Synkope, Angioödem. **Selten:** Pruritus, Hautausschlag, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Schläfrigkeit, Tachykardie, orthostat. Hypotonie, Rhinitis, Obstipation, Diarrhö, Übelkeit, Erbrechen, Ausschlag, Juckreiz, Urinkaria, anormale Ejakulation, Asthenie. **Selten:** Synkope, Angioödem. **Mat.-Nr.:** 3/30341/1. **Stand:** Januar 2006 HEXAL AG, 83607 Holzkirchen. <http://www.hexal.de>

Titelbild: CARO, Fotos: CARO, Berufsverband der Deutschen Urologen, Archiv, Archiv/Rose