


SCHWERPUNKT

KRANKE HAUT



Impetigo contagiosa ist die häufigste bakterielle Hautinfektion bei Kindern und als Blickdiagnose kein Problem. Im Schwerpunkt geht es auch um ausgefallene Hauterkrankungen

ab Seite 26

Infektiöse Hauterkrankungen

- Topisch oder systemisch behandeln? 26
- Lästige Krabbler: Milben, Läuse und Flöhe..... 28
- Tinea capitis bevorzugt Kinder zwischen drei und acht Jahren 29

Tumore

- Gutartige Knoten am Kopf 30

Trichotillomanie

- Zum Haareraufen 32

Vitiligo

- Melanozyten auf dem Rückzug 34

Neurodermitis

- Die hohe Kunst der Rezeptur 38
- Therapie bei geschulten Patienten erfolgreicher 40
- Neue Erkenntnisse zu Risiken und Erkrankungsraten 42

ÄP-Service

- Fachbücher, Patienten-Ratgeber, Internet-Adressen 44

Täglich aktuelle
Meldungen unter

www.aerztlichepraxis.de

ACC® Kindersaft

Erstanbieter: Fluimucil®

Neu von
HEXAL für die
kleinen Zwerge!



www.hexal.de

gebrauchsfertiger Saft

ohne Alkohol, Zucker
und Farbstoffe

mit leckerem Kirsch-
geschmack

Arzneimittel
Ihres Vertrauens



ACC® Kindersaft, Lsg. zum Einnehmen: Wirkstoff: Acetylcystein. Zusammensetzung: 1 ml Lsg. zum Einnehmen enth. 20 mg Acetylcystein. 1 Messbecher m. 10 ml Lsg. zum Einnehmen enth. 200 mg Acetylcystein. Sunstige Bestandt.: Carmellose-Na, Methyl-4-hydroxybenzoesäure (E 218), Na-Benzat (E 211), Na-Edetat (Ph. Eur.), Na-Hydroxid, Saccharin-Na, gereinigtes Wasser, Aromastoffe (Kirsche). Anwendungsgeb.: Zur Verflüssigung des Schleims u. Erleichterung des Abhustens b. erkältungsbedingter Bronchitis. Gegenanz.: Überempf. geg. Inhaltsstoffe Methyl-4-hydroxybenzoesäure, Anvend. b. Säugl. u. Kleinkid. < 1 J. nur b. lebenswichtiger Indikation u. strengster ärztl. Kontrolle. B. Kid. < 2 J. nur unter ärztl. Kontrolle anwenden. Nebenwirk.: Gelegentl. allerg. Reakt. (Juckreiz, Urtikaria, Exanthem, Rash, Bronchospastik, Angödem, Tachykardie, Blutdrucksenkung, Stomatitis, Bauchschmerzen, Übelk., Erbrechen, Durchfall, Selt.: Dyspnoe, Bronchospasmen) überwiegt b. Pat. m. hyperreaktivem Bronchialsystem b. Asthma bronchiale. Sehr selt.: anaphylakt. Reakt. bis hin zum Schock. Über das Auftreten v. Blutungen im Zusammenhang m. der Gabe v. Acetylcystein wurde berichtet z. T. im Rahmen v. Überempf.-reakt. Methyl-4-hydroxybenzoesäure kann Überempf.-reakt., auch Spätreakt., hervorrufen. Enth. Na-Verbind. u. Parabene (E 218). Weit. Einzelh. u. Hinw. siehe Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. Mat.-Nr.: 3 304107. Stand: Juni 2006/HEXAL AG, 83607 Holzkirchen. <http://www.hexal.de>

Fotos: Bilderbox (2), Caro, KES/Thieme. Titelfoto: Caro