

www.aerztezeitung.de

# ÄRZTE & ZEITUNG

DIE TAGESZEITUNG FÜR ÄRZTE

DIENSTAG 12. DEZEMBER 2006



## Rationierung – ein Job für Politiker

Die explizite Rationierung, wie bei einer Grippeimpfung für alte Menschen in den USA, ist in Deutschland die Ausnahme. Hierzulande gibt es aber die stille Rationierung.

**GESUNDHEITSPOLITIK 8**



## Forscher enträtseln den Sekundenschlaf

Sekundenschlaf verursacht zehn Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle. Forscher suchen nach Möglichkeiten, das Phänomen zu erkennen und zu verhindern.

**MEDIZIN 10**

### TIP DES TAGES

## Kirchensteuer ist reine Privatsache

Ärzte können ihren Steuerberater nicht haftbar machen, wenn er seinen Mandanten nicht auf die finanziellen Vorteile eines Kirchenaustritts hingewiesen hat. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden (Az.: IX ZR 53/05). Die Richter sehen es nicht als Aufgabe eines Steuerberaters an, den Austritt aus der Kirche zu empfehlen. Eine Haftung kommt nach Ansicht des Gerichts auch dann nicht in Frage, wenn der Mandant zuvor darüber geklagt hat, daß er hohe Kirchensteuer zahlen muß.

### HINTERGRUND

## Checkliste für Barrierefreiheit

Beim Bau oder Umbau von Praxen sollte darauf geachtet werden, daß sie für Behinderte gut zugänglich sind. **2**

### Studie zu Telemonitoring

# Kurze Spezialtherapie für gelähmte Hände fördert das Zupacken

Taubches Training auch in Deutschland angeboten

**ATLANTA (gwa).** Nach einem Schlaganfall mit Armparesen lohnt es sich auch noch nach Monaten, gezielt die Armfunktion zu fördern: etwa mit einem 14tägigen Taubches Training. Dabei wird der gesunde Arm ruhiggestellt und gezielt mit dem gelähmten geübt. Die Effekte halten mindestens ein Jahr an.

Das ergab eine prospektive Multi-centerstudie von Kollegen um Dr. Steven L. Wolf von der Universität in Atlanta (JAMA 296, 2006, 2095).

Arm, etwa mit Greifübungen. Ergebnis: Nach einem Jahr konnten die Patienten der FUT-Gruppe ihre teilgelähmte Hand im Vergleich zum Studienbeginn und zur Kontrollgruppe besser nutzen. Das ergab der Wolf Motor Function-Test. Geprüft wird, wie lange Patienten für 17 standardisierte Aufgaben wie Greifübungen brauchen. Patienten der FUT-Gruppe brauchten nur noch die Hälfte der Zeit (Kontrollgruppe: ein Viertel weniger Zeit). Und bei 30 geprüften Alltagsbewegungen (Motor Activity



Ein Belastungs-Aging-IGEL

Anti-

NEU-ISEN