Die Therapie der interstitiellen Zystitis ist eine der großen therapeutischen Herausforderungen in der Urologie. Einen Überblick finden Sie im Schwerpunkt

ab Seite 26

Schwerpunkt Blase & Niere

Urolithiasis

26 Update der Leitlinien

Interstitielle Zystitis

28 Heilung nicht in Sicht

30 Intravesikale Therapie – effektiv, aber schmerzhaft

31 Molekularer Behandlungsansatz

Nephrologie

32 Interview: Für die Peritoneal-Dialyse ist keiner zu alt

37 Prävalenz chronischer Nierenleiden steigt mit dem Alter

Harninkontinenz

34 Stammzellen für die Blase – Bericht vom 18. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft

36 Interview: Blasenschwäche – das verheimlichte Leiden

ÄP-Service

38 Fachbücher, Patienten-Ratgeber und Internet-Tipps

Beilage: Zertifizierte Fortbildung „Harnblasenkarzinom"



Täglich aktuelle Meldungen unter

www.aerztlichepraxis.de

Fotos: Superbild, Bilderbox, Archiv (2) Titelbild: Arteria Photography

Ihre Wahl bei BPH!

www.urologie.hexal.de

NEU von HEXAL:

Alfuzosin HEXAL® 10 mg

bis 52% Preisvorteil zu Uroxatral® uno*

Arzneimittel Ihres Vertrauens

HEXAL

*Alfuzosin HEXAL 10 mg OP 100 vs. Uroxatral uno OP 100. Lauer-Taxe, Stand: 15.01.2007

Alfuzosin HEXAL 10 mg Retardtabletten: Wirkstoff: Alfuzosin-HCl. **Zusammensetz.:** 1 Retardtbl. enth. 10 mg Alfuzosin-HCl, Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Povidon K25. **Anwendungsgeb.:** Behandl. der funktionellen Sympt. der benignen Prostatahyperplasie (BPH). **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe, gleichz. Einnahme v. and. Alpha1-Rezeptorenblockern, Leberinsuff., Komb. m. Dopamin-Rezeptoragonisten. **Nebenwirk.:** *Häufig:* Mattigkeit, Benommenh., Kopfschmerzen, Übelk., Oberbauchbeschwerden, Asthenie. *Gelegentl.:* Schläfrigk., Schwindel, Unwohlsein, gestörtes Sehvermögen, orthostat. Hypotonie, Synkopen, Tachyk., Palpitat., Rhinitis, Durchfall, Erbrechen, Mundtrockenh., Hautausschlag, Pruritus, Harninkontinenz, Hitzewall., Ödeme, Brustschmerzen. *Sehr selten:* Verschlimm. od. Wiederauftreten einer Angina pectoris. *In Einzelf.:* Priapismus. Enth. Lactose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/303855 **Stand:** März 2006 HEXAL AG, 83607 Holzkirchen. http://www.hexal.de

Tamsulosin HEXAL 0,4 mg retard Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung: Wirkstoff: Tamsulosin-HCl. Zusammensetz.: 1 Hartkaps. m. veränd. Wirkstofffreisetz. enth. 0,4 mg Tamsulosin-HCl, mikrokristall. Cellulose, Gelatine, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Natriumdodecylsulfat, Polysorbat 80, Talkum, Triethylcitrat, Drucktinte (Schellack, Eisen(II,III)-oxid (E 172), (3-sn-Phosphatidylcholin (Soja), Antischaummittel DC 1510), Farbst. E 132, E 171, E 172. **Anwendungsgeb.:** Behandl. v. Sympt. des unteren Harntraktes b. der benignen Prostatahyperplasie (BPH). **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe (einschließl. arzneimittelinduziertes Angioödem), anamnestisch bekannte orthostat. Hypotonie, schwere Leberinsuff. **Nebenwirk.:** *Häufig:* Schwindel. *Gelegentl.:* Kopfschmerzen, Tachykardie, orthostat. Hypotonie, Rhinitis, Obstipation, Diarrhö, Übelk., Erbrechen, Ausschlag, Juckreiz, Urtikaria, anormale Ejakulation, Asthenie. *Selten:* Synkope, Angioödem. *Sehr selten:* Priapismus. Weit. Einzelh. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/303410/1 **Stand:** Januar 2006 HEXAL AG, 83607 Holzkirchen. http://www.hexal.de