

Sterilitätsdiagnostik: Was Sie organisch, hormonell und andrologisch abklären müssen, lesen Sie im Schwerpunkt „Familienplanung“

ab Seite 28

Schwerpunkt Familienplanung

Sterilitätsdiagnostik

28 Organische Ursachen überprüfen

30 Hormonstatus abklären ist Pflicht

32 Risikofaktor Mann

Kontrazeption

34 Die richtige Pille für Diabetikerinnen

Schwangerschaft

35 Präeklampsie – schwere Verlaufsformen identifizieren

Kinderwunsch nach Krebs

39 Fortpflanzungsorgane vor Krebstherapie schützen

Reproduktionsmedizin

40 Schnäppchenjagd auf www.arzt-preisvergleich.de eröffnet

41 **CME-Fragebogen**



Täglich aktuelle Meldungen unter

www.aerztlichepraxis.de

Fotos: Bilderbox (3), Fotex. Titelbild: Fotex

ESTRAMON® 37,5

NEU

Niedrig dosierte HRT!

Jetzt Zuzahlungsfrei!

ESTRAMON® 25/ /50/75/100

1 x pro Woche:
ESTRAMON® UNO 50/75/100

Arzneimittel Ihres Vertrauens

HEXAL

www.hexal.de

Estramon® 37,5, Transderm. Pflaster: Wirkstoff: Estradiol. **Zusammensetz.:** 1 transderm. Pflast. m. 15 cm² enth. 3 mg Estradiol. Durchschnittl. Estradiolfreisetz. 37,5 µg/Tag. Sonst. Bestandt.: Acrylat-Copolymer, Polyethylenterephthalat, Polyethylenterephthalat, silikonisiert, RRR-alpha-Tocopherol-Zubereitung (USP). **Anwendungsgeb.:** Hormonsubstitutionstherap. b. Östrogenmangelsympt. nach der Menopause. Es liegen nur begrenzte Erfahr. b. der Behandl. v. Frauen über 65 J. vor. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsstoffe, besteh. od. früh. Brustkrebs bzw. ein entspr. Verdacht, östrogen-abhäng. malig. Tumoren bzw. ein entspr. Verdacht (v. a. Endometriumkarzinom), nicht abgeklärte Blutungen im Genitalbereich, unbehand. Endometriumhyperplasie, früh. idiopathische od. besteh. venöse Thromboembolie (tiefe Venenthrombose, Lungenembolie), besteh. od. erst kurze Zeit zurückliegende arterielle thromboembol. Erkrank. (v. a. Angina pectoris, Myokardinfarkt), akute Lebererkrank. od. b. zurückliegenden Lebererkrank., so lange sich die relevanten Leberenzym-Werte nicht normalisiert haben, Porphyrie, Schwangersch., Stillz. **Nebenwirk.:** *Sehr häufig:* Kopfschmerz., Erythem, Brustspannen, Brustschmerz., Dysmenorrhoe, Menstruationsbeschwerd. *Häufig:* Benommenh., Übelk., Bauchschmerz., Völlegefühl, Diarrhoe, Dyspepsie, Appetitsteig., Hautausschlag, trock. Haut, Pruritus, Akne, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, lokale Reakt. (Exantheme an der Applik.-stelle, Ödeme, Schmerz., Rückenschmerz, Asthenie, Brustvergrößer., Menorrhagie, zervik. Hypersekret., Fluor vaginalis, Zwischenblut. bzw. Schmierblut., Uteruskrämpfe, Vaginitis, Endometriumhyperplasie, Nervosität, Stimm.-schwank., Depress., Schlafstör., *Gelegentl.:* Palpitationen, Hypertonie, Migräne, Schwindel, Parästhesie, Sehstör., trockene Augen, Erbrechen, Haarausfall, Hautverfärb., Gelenkschmerz., Muskelkrämpfe, Veränd. der Libido, Angstzustände, Selt.: venöse Thromboembolie, allerg. Reakt., Urtikaria, Myasthenie, Leberfunktionsstör., Cholelithiasis, Sekret. der Brustdrüsen, Uterusleiomyome, paratubare Zysten, endozervik. Polypen, *Sehr selt.:* Chorea, Kontaktlinsenunverträglichk., Hautnekrosen, Hirsutismus, Veränd. der Glucosetoleranz, anaphylakt. Reakt., Östrogenabhäng. gutart. sowie bösart. Neoplasien der Geschlechtsorg. u. der Brust, venös. thromboembol. Ereign. häufiger als bei Nichtanwend., Myokardinfarkt u. Schlaganfall, Erkrank. der Haut u. subkutan. Gewebe wie Chloasma, Erythema multiforme, Erythema nodosum, vaskuläre Purpura, Verschlecht. einer Porphyrie, cholestat. Ikterus, wahrscheinl. Demenz. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/304769 **Stand:** Oktober 2006. HEXAL AG, 83607 Holzkirchen. http://www.hexal.de