

ÄRZTE ZEITUNG

DIE TAGESZEITUNG FÜR ÄRZTE

FRSTAG 15. MÄRZ 2007

D 8877 NR. 49 JAHRGANG 26



Verbieten oder lernen lassen?

Der Alkoholmissbrauch entzweit Gesundheitspolitiker: Geht ein totales Verbot des Alkoholkonsums für Jugendliche bis 18 Jahre zu weit?

GESUNDHEITSPOLITIK 2, 6



Fieber mit Ausschlag kann auch Lues sein

Die Syphilis-Erreger sind in Deutschland wieder im Kommen. Die Geschlechtskrankheit macht meist an vielen verschiedenen Organen Beschwerden.

MEDIZIN 10



Die fetten Früchte des Wohlstands

Chinas wachsender Wohlstand trägt fette Früchte. 60 Millionen Chinesen gelten bereits als übergewichtig oder gar adipös, Tendenz steigend.

PANORAMA 16

DES TAGES Pendlerspau- schale der Kippe

ir den Weg zwischen Wohnung und Praxis gilt seit diesem Jahr, dass nur noch Fahrten ab dem 21. Kilometer von der Steuer abgesetzt werden können. Hoffnung, dass diese Regelung wieder gekippt wird, gibtschluss des Niedersächsischen Finanzrichts. Dessen Richter halten die Begrenzung der steuerlichen Parkeit von Fahrten zwischen Wohn- und Betriebsstätte mit dem Grundvereinbar ist. Da nicht abzusehen

Schwere COPD: Steroid ist jetzt oft ein Muss

COPD-Leitlinie überarbeitet/Schwere COPD beginnt bereits bei Einsekundenkapazität unter 50 Prozent

NEU-ISENBURG (cin/ikr). Patienten mit einer COPD sind bereits dann schwer krank, wenn die Einsekundenkapazität (FEV₁) unter 50 Prozent des Sollwertes liegt. Bisher galten Patienten erst bei FEV₁-Werten unter 30 Prozent als schwer krank. Das ist eine wesentliche Neuerung in der jetzt aktualisierten COPD-Leitlinie – mit Konsequenzen für die Therapie.



Leitlinie mitgewirkt hat, zur „Ärzte Zeitung“. „Unterschreiten Patienten diesen Grenzwert, beginnt die Phase, in der meist die Komplikationen anfangen. Die Patienten werden hoch symptomatisch und entwickeln Exazerbationen.“

Patienten mit schwerer COPD benötigen nach der neuen Leitlinie eine intensivere Therapie: In diesem Stadium sollen Patienten mit wiederkehrenden Exazerbationen zusätzlich zur Dauertherapie mit langwirksamen Bronchodilatoren jetzt grundsätzlich auch inhalative Kortikoide erhalten.

**48. Kongress
der Deutschen
Gesellschaft für**

