

Kongress kompakt

- 91 — 12. Biedersteiner Symposium, München, 10.2.2007
Dermatologie im Kindesalter
- 98 — Therapie der Psoriasis vulgaris
S3-Leitlinie soll Versorgung verbessern

Journal Club

- 99 — Anti-TNF-alpha-Therapie: Immunsuppression fördert Hautkrankheiten
- 100 — Vorteile durch Antisense-Oligonukleotid? ...
IL-2-Rezeptor als prognostischer Serummarker?
- 101 — Sentinel-LK-Suche nach Melanom-Exzision:
zweizeitiges Vorgehen kein Nachteil
- 102 — Radiochemotherapie tendenziell besser ...
Plasmozytom: Osteonekrose durch hoch dosierte
Bisphosphonate
- 103 — Empfehlungen zur Hautpflege? – eine komplexe
Frage ... Nicht jeder rote Popo ist eine Windel-
dermatitis!
- 104 — EGFR-I: Kutane Nebenwirkungen besser
beherrschen ... Psoriasis: Welchen Einfluss hat
Kaffeekonsum auf die Wirkung von Methotrexat?
- 107 — Skabies: Milbennachweis mit simplem Klebeband
... Analfissur: Nitroglycerincreme und Botulinum-
toxin A im direkten Vergleich

Praxismanagement

- 109 — Vorgezogenes Altersruhegeld – Teil II
Ein Grund für Freudensprünge?

Dermatologie im Kindesalter

Interdisziplinäres Vorgehen ist bei Hautkrankungen im Kindesalter mitunter Pflicht. Ein Symposium ermöglichte Dermatologen wie Pädiatern einen Blick über den Tellerrand der eigenen Fachrichtung.


91



Malignes Melanom

Häufig werden maligne Melanome primär von niedergelassenen Dermatologen exzidiert und erst später erfolgt die Suche des Sentinel-Lymphknotens. Schadet hier die vorausgegangene Exzision?

99



Weitere Rubriken

- 88 — Buchtipps
- 97 — Termine
- 111 — Pharma News
- 115 — Impressum /
letzte Meldung:
Gesundheitsrisiko
biogener Partikel

Skinoren 15% Gel
einziges für
Anzeige