

# Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde

April 2007 · Seite 221 – 376 · 224. Band

- In Kürze:** In einer retrospektiven Analyse wurde die Resistenzlage der am häufigsten aus ophthalmologischen Abstrichen kultivierten Bakterien untersucht. Über einen Zeitraum von 20 Jahren konnte keine Änderung der Resistenzlage gegenüber den in der Schweiz zugelassenen topischen Antibiotika nachgewiesen werden.
- 244 **Qualitätssicherung in der Biometrie vor Kataraktoperationen: Welche Patienten haben ein erhöhtes Risiko für Abweichungen von der Zielrefraktion?**  
Quality Assurance in Biometry before Cataract Surgery: Which Patients have an Increased Risk of Aberrance from Target Refraction?  
*S. Hayek, C. Kniestedt, D. Barthelmes, J. Stürmer*
- In Kürze:** Vier der am häufigsten erhobenen biometrischen Messwerte wurden bezüglich ihres Einflusses auf das refraktive Ergebnis bei Kataraktchirurgie untersucht. Es konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen einem oder mehreren der vier Werte und einer erhöhten Abweichung von der Zielrefraktion nachgewiesen werden.
- 249 **Phosphate in Glaukompräparaten**  
Phosphate Concentrations in Antiglaucoma Medication  
*W. Bernauer, M. A. Thiel, K. M. Rentsch*
- In Kürze:** 21 Glaukompräparate wurden auf ihren Phosphatgehalt untersucht. Etwa die Hälfte der in der Schweiz erhältlichen Glaukompräparate weisen unphysiologische hohe Konzentrationen auf (> 1,45 mmol/L). Bei vier Präparaten, die den Beta-Blocker Timolol enthalten, wurden sehr hohe Konzentrationen (> 100 mmol/L) gemessen. Bei kompromittierter Augenoberfläche sollten solche Präparate gemieden werden, da sie die Entwicklung von durchgreifenden Hornhautverkalkungen begünstigen.
- 252 **Praxisorientierter Vergleich der Strategien TOP und dynamisch in der statischen Perimetrie (Octopus): Eine prospektive Studie**  
Comparison of Tendency-Oriented Perimetry and Dynamic Strategy in Octopus Perimetry as a Screening Tool in a Clinical Setting: A Prospective Study  
*M. Scherrer, J. C. Fleischauer, H. Helbig, K. Johann auf der Heide, F. K. Sutter*
- In Kürze:** Die TOP Strategie ist eine schnelle, Patienten-freundliche und zuverlässige Screening-Methode in der allgemein-ophthalmologischen Praxis. Durch die methodische Ungenauigkeit entstanden in der untersuchten Patientengruppe keine falsch-negativen Resultate.
- 255 **Positiver Ibopamin Provokationstest bei Verdacht auf Niederdruckglaukom**  
Positive Ibopamine Provocative Test in Normal-Tension Glaucoma Suspects  
*C. Kniestedt, T. Romppainen, B. P. Gloor, J. Stürmer*
- In Kürze:** Topische Ibopaminapplikation verursacht in einigen Augen mit Verdacht auf Niederdruckglaukom einen vorübergehenden Druckanstieg. Dieser Druckanstieg könnte auf eine erhöhte Resistenz im Trabekelwerk hinweisen in Augen, die ein erhöhtes Risiko tragen, an einer Druckproblematik zu erkranken.
- 260 **Vor dem 24. Lebensmonat operiertes Frühkindliches Schielen: Langzeit-Resultate der beidseitigen Fadenoperation mit simultaner Rücklagerung der mm. recti interni**  
Esotropie précoce: résultats à long terme d'une série de 82 cas opérés par myopexie rétro-équatoriale et recul simultané des deux muscles droits médiaux avant l'âge de 24 mois  
*G. Klainguti, B. Lise-Schneider, J. Bremart-Strickler*