

# Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde

April 2007 · Seite 221 – 376 · 224. Band

**In Kürze:** Langzeit-Resultate von 82 frühoperierten kongenitalen Esotropien, mittels Fadenoperation und gleichzeitiger Rücklagerung beider MM recti interni.

- 265 Vergleichende Untersuchung zweier ERG-Elektroden betreffend ERG-Ableitungen und Patientenkomfort  
Comparison of Performance and Patient Satisfaction of Two Types of ERG Electrodes  
*P. Beeler, D. Barthelmes, F. K. Sutter, H. Helbig, J. C. Fleischhauer*

**In Kürze:** DTL Fadenelektroden bieten eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen ERG-Elektroden. Sie sind günstig, werden einmalig gebraucht, von den Patienten besser toleriert und sind von den elektrischen Eigenschaften mit herkömmlichen Elektroden vergleichbar.

- 269 Periokuläre subtenonale Triamcinoloninjektionen zur Behandlung von retinal angiomatösen Proliferationen (RAP) und okkulter choroidalen Neovaskularisationen  
Periocular Sub-tenon Triamcinolone Acetonide Injections for the Treatment of Retinal Angiomatous Proliferation (RAP) and Occult Choroidal Neovascularisation  
*Y. Rutishauser-Arnold, A. M. Thölen*

**In Kürze:** Retrospektive Fallserie von 39 Augen, entweder mit retinal angiomatöser Proliferation (RAP) oder mit okkulter choroidaler Neovaskularisation (CNV), welche mit periokulären subtenonalen Injektionen mit Triamcinolonacetamid behandelt wurden. Ein wirksamer und kostengünstiger Eingriff bei beginnender exsudativer AMD mit RAP und okkulter CNV.

- 274 Pseudomelanome der Aderhaut  
Pseudomelanomas of the Choroid  
*B. M. Stoffels, K. Schöpfer, C. Kramann*

**In Kürze:** Die Krankenblätter von 486 Patienten, die sich mit der Verdachts-/Ausschlussdiagnose malignes Aderhautmelanom zwischen 1.1994 und 1.2004 in der Mainzer Universitäts-Augenklinik vorstellten, wurden retrospektiv ausgewertet. In 212 Augen wurde die Verdachtsdiagnose bestätigt, in 246 Augen lag eine andere Erkrankung vor („Pseudomelanom“). Häufigste Ursache für das „Pseudomelanom“ war die disziforme Maculadegeneration (34%) noch vor dem „verdächtigen Aderhautnaevus“ (31%). Aufgrund steigender Inzidenz wird die altersabhängige Maculadegeneration (AMD) zukünftig in der Differentialdiagnose des malignen Aderhautmelanoms zunehmend beachtet werden müssen.

- 279 Erste klinische Erfahrung mit Anecortave Acetat (Retaane®)  
First Clinical Experience with Anecortave Acetate (Retaane®)  
*S. Hayek, M. Scherrer, D. Barthelmes, J. C. Fleischhauer, M. M. Kurz-Levin, M. Menghini, H. Helbig, F. K. P. Sutter*

**In Kürze:** Anecortave Acetat ist ein angiostatisches Cortison, welches als posteriores juxtasklerales Depot (PJD) appliziert wird und sich in Studien als wirksam gegen exsudative altersbedingte Makuladegeneration erwiesen hat. Bei Augen mit okkulter CNV ohne „recent progression“ oder residueller neovaskulärer Aktivität nach PDT stellt Anecortave Acetat eine alternative therapeutische Option dar.

- 282 Radiäre Optikusneurotomie (RON) bei retinalen Zentralvenenverschlüssen  
Radial Optic Neurotomy (RON) for Central Retinal Vein Occlusion  
*B. M. Stoffels, C. Kramann, E. Hoffmann*



**Titelbild:** Papillenschwellung und kranzförmige Blutungen, S. 286