

Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde

April 2007 · Seite 221 – 376 · 224. Band

- 324 Ultraschallbiomikroskopische Untersuchung des Kammerwinkelblocks einer Patientin mit multiplen und beidseitigen Iridoziliarzysten
Ultrasound Biomicroscopy Evaluation of Angle Closure in a Patient with Multiple and Bilateral Iridociliary Cysts
J. M. Katsimpris, I. K. Petropoulos, G. Sunaric-Mégevand
In Kürze: Die Ultraschallbiomikroskopie ist ein höchst wertvolles Hilfsmittel zur Diagnose primärer Iridoziliarzysten. Obwohl diese Zysten nur vereinzelt beobachtet werden, können sie sich in seltenen Fällen vergrößern und den vorderen Kammerwinkel beeinträchtigen, sodass es zum Winkelblock kommt.
- 328 Exzessives Tränen bei Gleitsichtglasfehlzentrierung
Excessive Tearing due to Decentred Progressive Eyeglasses
R. Osusky
In Kürze: Falldemonstration eines Patienten mit Hauptsymptom des Tränens, dessen Ursache nicht trockene Augen, sondern stark dezentrierte Gleitsichtgläser in der kurz zuvor angefertigten Brillen waren. Der Beitrag unterstreicht sowohl die therapeutische Wirkung des gezielten Behebens der Ursache als er uns auch an die Möglichkeit erinnert, dass dezentrierte Gleitsichtgläser zu optischer Asthenopie führen können.
- 331 Chirurgische Behandlung der Diplopie bei endokriner Orbitopathie (EO)
Traitement chirurgical de la diplopie secondaire à l'orbitopathie dysthyroïdienne
E. M. Pitchon, G. Klainguti
In Kürze: Ergebnisse der nicht-justierbaren Muskelchirurgie bei endokriner Orbitopathie. Berücksichtigung der muskulären Restriktion bei der Operationsindikation.
- 334 Ungewöhnliche Ursache bilateraler Papillenschwellung: Das POEMS Syndrom
Unusual Cause of Bilateral Optic Disc Swelling: POEMS Syndrome
C. Wiaux, K. Landau, F.-X. Borruat
In Kürze: Sowohl die Papillenschwellung wie auch das Makulaödem können beim POEMS Syndrom vorkommen und eine ophthalmologische Betreuung erfordern.
- 337 Bilaterale Opticusneuritis als initiale Manifestation eines Sjögren-Syndroms
Bilateral Sequential Optic Neuropathy as the Initial Manifestation of Sjögren Syndrome
J.-A. C. Pournaras, J. D. Vaudaux, F.-X. Borruat
In Kürze: Eine bilateral sequenzielle atypische entzündliche Optikusneuropathie kann die erste Manifestation eines Sjögren Syndrom bei einem ansonsten gesunden Patienten sein.
- 340 Kombination von Fanconi-Syndrom und Retinis pigmentosa, verursacht durch eine Verdoppelung/Deletion von mitochondrialer DNS
Patient with Fanconi Syndrome (FS) and Retinitis Pigmentosa (RP) Caused by a Deletion and Duplication of Mitochondrial DNA (mtDNA)
E. M. Pitchon, F. Cachat, S. Jacquemont, C. Hinard, F.-X. Borruat, D. F. Schorderet, M. A. Morris, F. L. Munier
In Kürze: Multisystemische Störungen, die Organe mit einem hohen Metabolismus betreffen, müssen den Verdacht auf eine Mitochondriopathie wecken