

Aktuelle Rheumatologie

April 2007 · Seite 53 – 108 · Band 32

2 · 2007



Nicht alle Formen der Gonarthrose profitieren gleichermaßen von einer Orthese: S.58

Für Sie notiert

- 53 Systemischer Lupus erythematoses: Hydroxychloroquin-Spiegel als Marker für Exazerbation
- 54 Polymyositis und Dermatomyositis: Schlechte Langzeitprognose
- 54 Sjögren-Syndrom: Lymphomrisiko erhöht
- 56 Prognose der Rheumatoiden Arthritis: Konsequente Therapie zeigt Erfolg
- 58 Gonarthrose: Orthesenbehandlung: bei Varus-Fehlstellung am effektivsten
- 60 Coxibe und NSAR: Rate an kardiovaskulären Ereignissen kaum erhöht
- 60 Klinische Forschung: Schmerzgetests können Therapieerfolg voraussagen
- 62 Risikoscore: Vorhersage der Frakturwahrscheinlichkeit möglich
- 62 Ciclosporin und Methotrexat bei RA: Kombinationstherapie verbessert Krankheitskontrolle
- 64 Rheumatoide Arthritis: TNF-Hemmer erhöhen Infektionsrisiko
- 64 Buchbesprechung
- 66 Das Gespräch mit dem alten Patienten: Patronisierung strikt vermeiden!
- 71 **Medizin und Markt**

Editorial

- 73 S. Rehart

Originalarbeiten | Originals

- 74 ▶ Moderne rheumatische Basistherapie perioperativ – Patienten des rheumatischen Formenkreises unter Therapie mit Methotrexat, Leflunomid bzw. TNF-Alpha-Blockern perioperativ
Modern Disease Modifying Drugs in Rheumatoid Arthritis in the Perioperative Period – Patients with Rheumatic Diseases under Therapy with Methotrexate, Leflunomide or TNF-alpha Blockers in the Perioperative Period
S. Rehart, N. Petak
- 78 ▶ The Oral Health of Rheumatoid Arthritis Patients in Niigata, Japan
Mundgesundheits bei Patienten mit Rheumatoider Arthritis in Niigata, Japan
A. Murasawa, R. W. Evans, A. Murasawa, C. C. Peck, P. Ottl
- 86 ▶ Systematische Auswertung von MRT-Aufnahmen des Kiefergelenks anhand eines neu entwickelten standardisierten Befundbogens
Assessment of the Temporomandibular Joint using MRI and a New Standardised Evaluation Form
P. Ottl, A. Hohmann, A. Piwowarczyk, H.-Ch. Lauer, F. Zanella