



Die individuellen Bedürfnisse der Patienten wahrnehmen

Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann berichtet in einem Interview, wie sie ihre Brustkrebserkrankung erlebt hat und wie sie mit dem Klinikalltag, den Ärzten und ihrer Umgebung zurecht gekommen ist. Es sei wichtig, den Menschen nicht auf seine Krankheit zu reduzieren, lautet ihr Anliegen.

8

DARMKREBS-SCREENING

Männer und Frauen bekommen ab dem 55. Lebensjahr eine Koloskopie bezahlt. Frauen erkranken allerdings im Schnitt erst 5 Jahre später als Männer. Sollten Screening-Programme Gender-abhängig gehandhabt werden?

IMMUNSYSTEM

NKG2D-Liganden könnten Tumorzellen sichtbar machen, wenn ihr Abwerfen durch Medikamente verhindert wird.

TUMORENTSTEHUNG

Infektionskrankheiten im Kindesalter haben offensichtlich einen Einfluss auf die spätere Krebsentstehung. Viele Geschwister sind daher wahrscheinlich ein Risikofaktor.


DARMKREBSFRÜHERKENNUNG

Kostendruck, ökonomischer Nutzen oder pure Menschlichkeit? Die Stiftung LebensBlicke diskutierte in einem wissenschaftlichen Symposium über ökonomische Aspekte der Darmkrebsvorsorge.

PROSTATAKARZINOM

Der Proteaseinhibitor Alpha2-Makroglobulin (A2M) hat eine Tumor-hemmende Wirkung. Dem Mechanismus sind Forscher aus Leipzig auf der Spur.

14



Palliativmedizin – Das Unfassbare in Worte fassen

„Wir müssen die Menschen auf das Sterben vorbereiten, weil sie es wollen“, sagt Prof. Stein Husebø. Dazu gehört es, dass unnötige Schmerzen und Leid vermieden werden. Im Gegensatz zur Euthanasie-Bewegung reagiert die Palliativmedizin allerdings zögerlich auf die demographische Entwicklung.

15

HER2-POSITIVES MAMMAKARZINOM

Die BCIRG 006-Studie untersucht die Wirksamkeit eines nicht Anthrazyklin-haltigen Regimes. Hier lesen Sie Ergebnisse der 2. Interimsanalyse.

16

6 DURCHBRUCHSCHMERZEN

Akute Schmerzattacken können mit einer Opioid-Basismedikation nicht kontrolliert werden. Es eignet sich der Fentanylstick.

17

10 INDIKATIONSERWEITERUNG FÜR TOPOTECAN

Eine randomisierte Studie der GOG zeigte, dass Topotecan in Kombination mit Cisplatin effektiv bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Zervixkarzinom in gesichertem Stadium IVB war.

22

12 TRANSKRIPTIONSFAKTOREN

Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums zeigten, dass die Transkriptionsfaktor-Bindung an den uPAR-Promoter bei Darmkrebs ein früher Prognosefaktor ist.

23

13 AKUTE PROMYELOZYTENLEUKÄMIE

Neu diagnostizierte APL-Patienten, die nach einer Standardbehandlung zusätzlich zwei Zyklen Arsen-trioxyd erhalten, leben länger.

24