

# INHALT

DNP · Mai 2007

## Aktuell

- › 8 Schmerz und Empathie: Geteiltes Leid, doppeltes Leid?
- › 10 IQWiG-Bericht zu AChE-Hemmern  
Wirksamkeit für alle drei Substanzen bestätigt
- 12 Modernste und teuerste Therapie für alle?  
Eine Pro+Contra-Diskussion zur Parkinsonbehandlung
- 14 ZNS-Sprechstunde: Somatisierte Depression
- 16 Therapie der Generalisierten Angststörung  
Leserbrief und Kommentar
- 18 Schwerpunkt Parkinson-/Restless-Legs-Syndrom  
Aktuelle Studien für Sie gelesen
- 22 Ranking des Monats: Die gefährlichsten Suchtmittel

## Abrechnung

- › 24 EBM-Nr. 16233: Neue neurologische Betreuungsleistung

## FORTBILDUNG



### Psychiatrie

- › 26 CME: Pharmakotherapie der Schizophrenie  
Welche Kombinationsstrategien sind sinnvoll?

### Neurologie

- › 34 CME: Neuroonkologie  
Therapie maligner Gliome: State of the Art
- › 43 MRT-Bildgebung bei Epilepsie  
Standards und Empfehlungen
- 48 Small-fiber-Neuropathien erkennen und behandeln  
Anatomie, Klinik, Diagnostik und Therapie

52 Industrie & Forschung

57 Impressum

› = Titelbeiträge




## 8 Vermehrt Empathie die Schmerzlust?

Bei Mitleid werden im Gehirn Schmerzareale aktiviert. Hirnforscher meinen, dass Empathie so die Schmerzlust potenziert, die die moderne Medizin durch steigende Lebenserwartung und falsche Narkosemethoden hervorruft.



## 48 Small-fiber-Neuropathien sind häufig besonders schmerzhaft für den Patienten und frustrierend für den Arzt. Lesen Sie einen klinisch orientierten Beitrag zu Diagnostik und Therapie.



## 43 Magnetresonanztomographie in der Epileptologie Welchen Stellenwert hat diese Form der Bildgebung heute?