

## Schwerpunkt

S. Böhm, M. Sinclair, R. Stücker

- 233 **Die Mittelfußosteotomie – eine Behandlungsmöglichkeit des Pes Cavus im Kindes- und Jugendalter** (Reviewed Article)

C. Heck, J. Jerosch

- 239 **Vergleichende Untersuchung zwischen Scarf- und Ludloff-Osteotomie in der Therapie des Metatarsus primus varus mit Hallux varus**

J. Jerosch, T. J. Filler, M. G. Morsy, K. Szalai

- 247 **Sinus tarsi – ein propriozeptives Organ?**

T. Kluba, R. Gaa, T. Niemeyer

- 251 **Bringt der Einsatz von metallischen Platzhaltern bei der operativen Therapie von Infektionen der Wirbelsäule Vorteile?**

A. Schuh, U. Holzwarth, P. Grewe, M. Kästel, W. Hönle

- 255 **Die Anwendung von Formgedächtnismaterialien in der Medizin**

U. Maus, S. Andereya, S. Gravius, J. A. K. Ohnsorge, C. H. Siebert, M. M. Kaufmann, C. Niedhart

- 264 **Klinische Erfahrungen mit dem resorbierbaren Knochenersatzstoff Cerasorb®**

### Titelabbildungen:

a: Röntgen LWS seitlich i.S. weist den Höhenverlust bei bisegmentaler Spondylodiszitis LWK 4/5 und LWK 5/SWK 1 aufgrund der knöchernen Destruktion nach.

b: Röntgen anterioposterior präoperativ.

c: Rekonstruktion der Höhe der ventralen Säule mit ALIF-Platzhaltern nach Debridement.

d: Röntgen LWS ap i. S. im postoperativen Follow-up.

