

ÄP-Hotline Schilddrüse

MÜNCHEN (br) – Subklinische Hypothyreose übersehen? Schwerwiegenden Risikofaktor nicht korrigiert? Nicht mit uns! Alle Fragen zu Diagnostik und Therapie der subklinischen Schilddrüsen-Unterfunktion beantworten Ihnen am 20. Juni auf unserer kostenfreien Hotline unsere Schilddrüsen-Experten: Prof. Rudolf Hörmann, Klinik-Chef aus Lüdenscheid, und Prof. Martin Grußendorf, niedergelassener Endokrinologe aus Stuttgart. Machen Sie sich schlau, zum Wohle Ihrer Patienten!

Rufen Sie an:

- Mittwoch, 20. Juni 2007
- 13.00 bis 15.00 Uhr
- 08 00 2 37 98 30*

*kostenlose Telefonnummer

Eine gemeinsame Aktion von ÄRZTLICHE PRAXIS und Merck Pharma GmbH.



60 hierzulande tätigen Generikahersteller.

Leichenschau gleicht Russischem Roulette

WÜRZBURG (hw/kc) – Die Leichenschau korrekt abzurechnen, gleicht einem verschärften Russischen Roulette. Hinzu kommt eine absolut ungenügende Vergütung. Deshalb übernehmen Ärzte die aufwendige Aufgabe ungern.

Wer in diese Situation kommt, muss beachten: Eine Leichenschau darf nur bei sicheren Todeszeichen abgerechnet werden. Dies bedeutet sehr häufig einen zweiten Besuch zu einem späteren Zeitpunkt.

gehen aufeinander los, Apotheker-Funktionäre nehmen Ge-

Insbesondere der Arzt im Notfall- oder Bereitschaftsdienst wird oft zu einem sterbenden oder zwischenzeitlich verstorbenen Patienten gerufen. In beiden Fällen geht der Besuch zu Lasten der GKV. Es fällt auch die Kassengebühr an.

Aber: Die vorläufige Bescheinigung des Todes kann nicht nach GOÄ 100 abgerechnet werden, da der Leistungsinhalt nicht erfüllt ist. Hier werden nach GOÄ die GOP 7 und 70 fällig.

Weitere Tipps

→ 13

mass die Kinderkrankheiten eines Tages verschwinden → 13

Unorthodoxe Kortisongabe

MANNHEIM (bü) – Einsatzmöglichkeiten für Kortison, wie sie nicht in Lehrbüchern stehen, schilderte Prof. Dr. med. Heinrich Worth, Fürth, beim Pneumologenkongress. Als Beispiel nannte der Lungenspezialist eine Pneumonie mit Pleuraergüssen, die sich allzu zögerlich auflösen. Hier empfahl Worth systemische Behandlung mit Kortison, um dem Patienten erhebliche Einschränkungen der Lungenfunktion, eventuell gar eine Operation zu ersparen. Beginnen sollte die Therapie spätestens sechs Wochen nach Symptombeginn → 7

Kassenminus freut Ulla Schmidt

BERLIN (rb) – Ein Minus von 700 Millionen Euro melden die gesetzlichen Kassen für das Quartal I/2007. Ulla Schmidt freut sich: Das im Vergleich zum Vorjahr geringere Minus deutet auf ein Plus zum Jahresende.

Nicht-Versicherte zeigen wenig Rückkehr-Interesse

BERLIN (rb) – Die schätzungsweise 300 000 nicht Krankenversicherten in Deutschland lockt die Versicherungspflicht offenbar kaum zu den Kassen. Laut Umfrage des „Tagesspiegel“ verzeichnet die Barmer 1 000, die DAK 1 700, die TK 699 Rückkehrer.

NEUE
Wirkstärke

Bei chronischer exokriner Pankreasinsuffizienz*

Ozym® 40.000 – Hoch dosiert, tief kalkuliert.

Zs. A
5331x
ZB MED

Ozym®
40.000

Ozym® 40.000
100 magensaftresistente Hartkapseln zum Einnehmen

*einhergehend mit einer Maldigestion

Ozym® 40.000 Pankreaspulver vom Schwein: bei exokriner Pankreasinsuffizienz **Zusammensetzung:** 1 magensaftresistente Hartkapsel Ozym 40.000 enthält: 319,05-414,35 mg Pankreaspulver vom Schwein entsprechend Lipaseaktivität 40 000 Ph. Eur.-Einh., Amylaseaktivität mind. 25 000 Ph. Eur.-Einh., Proteaseaktivität mind. 1 500 Ph. Eur.-Einh. Sonstige Bestandteile: Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) [Ph.Eur.], Triethylcitrat, Talkum, Simecon, Natriumdodecylsulfat **Anwendungsgebiete:** Störungen der exokrinen Pankreasfunktion, die mit einer Maldigestion einhergehen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Schweinefleisch oder einen der sonstigen Bestandteile. Bei akuter Entzündung der Bauchspeicheldrüse und akutem Schub einer chronischen Bauchspeicheldrüsenerkrankung während der bestehenden starken Erkrankungsphase. In der Abklingphase während des diätetischen Aufbaus ist jedoch gelegentlich die Gabe von Pankreaspulver bei Hinweisen auf noch oder weiterhin bestehende Insuffizienz sinnvoll. Bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere mit Mukoviszidose, ist auf intestinale Obstruktionen zu achten. Kinder unter 15 Jahren mit Mukoviszidose. **Nebenwirkungen:** Sehr selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen vom Soforttyp (wie z.B. Hautausschlag, Niesen, Tränenfluss, Atemnot durch einen Bronchialkrampf) sowie Überempfindlichkeitsreaktionen des Verdauungstraktes nach Einnahme von Pankreaspulver beschrieben worden. Bei Patienten mit Mukoviszidose ist in Einzelfällen nach Gabe hoher Dosen von Pankreaspulver die Bildung von Verengungen der Krummdarm / Blinddarmregion und der aufsteigenden Dickdarmabschnitte beschrieben worden. Diese Verengungen können unter Umständen zu einem Darmverschluss führen. Bei Patienten mit Mukoviszidose kann vor allem unter der Einnahme hoher Dosen von Pankreaspulver eine erhöhte Harnsäureausscheidung im Urin auftreten. Daher sollte bei diesen Patienten die Harnsäureausscheidung im Urin kontrolliert werden, um die Bildung von Harnsäuresteinen zu vermeiden. **Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise:** Intestinale Obstruktionen sind bekannte Komplikationen bei Patienten mit Mukoviszidose. Bei Vorliegen von darmverschlussähnlichen Krankheitszeichen sollte daher auch die Möglichkeit von Darmstrikturen in Betracht gezogen werden. Durch Zerkauen der pankreaspulverhaltigen Hartkapsel kann es im Mund zu Schleimhautschädigungen kommen (unzerkaut schlucken). **Darreichungsformen und Packungsgrößen:** Ozym 40.000: OP mit 50 (N1), 100 (N2), 200 (N3) magensaftresistenten Hartkapseln. Trommsdorff GmbH & Co. KG Arzneimittel 52475 Alsdorf. Stand der Information: November 2006

Published by
Reed Business Information

InTime Services GmbH, Bajuwarenring 14, 82041 Oberhaching
Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt

01372

B01045#02247985#024

Deutsche Zentralbibliothek
für Medizin
Gleueler Str. 60
50924 Köln